




3 2044 106 336 290

*509*

*Q-30*

**Library  
Arnold Arboretum**



**of  
Harvard University**

Rebound February 1966





Anal. p.

# ACTA


SOCIETATIS REGIÆ

# SCIENTIARUM

UPSALIENSIS.

AD ANNUM MDCCXLIII.

U. 4.



\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*


STOCKHOLMIÆ

Typis & sumtibus LAURENTII SALVÆ

Anno 1749.

THE  
SOCIETY OF  
MUSICIANS

OF THE  
CITY OF LONDON



1850

# INDEX ACTORUM.

---

- |   | Pag. |
|---|------|
| 1. <i>E</i> pistola ad Societatem Regiam,<br>data a G. WALLIN. - - -  | 1    |
| 2. Observationes Eclipsium Secundi Sa-<br>tellitis Jovis, a diversis Astronomis<br>habitæ; ex quibus Theoria motuum<br>ejusdem Satellitis est deducta a P. W.<br>WARGENTIN. - - - | 18   |
| 3. <i>Runographia</i> Gothlandica; Auctore<br>G. WALLIN. - - -  | 55   |
| 4. <i>Plantæ Coldenhamiæ</i> in Provincia No-<br>veboracensi Americes sponte cre-<br>scentes, quas ad methodum Cl. LIN-<br>NAEI Sexualem, anno 1742. &c. ob-<br>serva-            | )    |

servavit & descripsit C. COLDEN.

81

5. SIDA florum capitulis pedunculatis  
triphyllis septemfloris descripta a C.  
LINNÆO.

137



ACTA





*Geringius Sc.*

# ACTA SOCIETATIS REGIÆ SCIENTIARUM.

\* \* \*  
REGIÆ & ILLUSTRIS  
SOCIETATI  
LITERARIÆ AC SCIENTIARUM  
UPSALIENSI

S. D. P.  
GEORGIUS WALLIN.  
*Episcopus Gothoburg. Soc. Reg. Ups. Soc.*



Nnus jam agitur undecimus, ex quo  
Academico docendi muneri & So-  
cietati simul Regiæ Scientiarum ac  
Literariæ Upsaliensi valedicens, ad  
transmarinas *Gothlandiæ* Ecclesias,  
abii. Minime sub id tempus legis  
sextæ Constitutionis Reg. anno  
eidem Societati præscriptæ imme-  
mor.

MDCCXXVIII

A

mor, Symbolas utique meas, licet exigui pretii, in medium proferre discupii. Ast foris semper Apostolus, intus raro Monachus (a), desiderio satisfacere meo non potui. Quis enim nesciat præterlapsorum, utut paucorum, annorum publicas curas ac molestias? Breve, quod ultimis Comitibus succedebat, otium, mox nova ad *Gothoburgenses* transmigracione interruptum.

Monuit interea sæpius & urfit Societatis Reg. Secretarius & Professor Vester inclutus D. CAROL. LINNÆUS, idque novissime literis die VII. mensis Aprilis Upsalia perscriptis, ut *monumenta Runica*, quæ in Gothlandia inter alia antiquitatis rudera collegeram, publicis Actis non denegarem. Vehementer doleo, virum hunc nobis amicissimum die XIII Julii se Gothoburgensi urbe proripuisse eodem, quo ego a trimestri per Hallandiam visitacione domum nuper redii. Sed Vir impatiens moræ, volucris per æthera similis, detineri a meis, quidquid tentarent, se non passus, saltus jam, montana & prata perlustrat Bahusana, ceu alter Ruben vel Theophrastus, mira & in nata quasi novorum florum cupidine.

*Cippos*, quos habeo Runicos, licet eos singulari in Gothlandia mea illustrata Capiti destinavi, libentissime offeram; nihil magis in votis habens, quam ut decoris aliquid publicis Patriæ Actis & lucis vel minimum historiæ arctæ concilient.

Id mihi unum paciscor, ut eadem methodo uti liceat, quâ olim b. m. BROMELIUS Nostras in sua Lithographia seu lapidibus tradendis usus est. Debe-

(a) Adam, Brenn. Lib. I. Cap. 31.

bant illi, maximam partem, natales suos litoribus Gothlandicis, mea vero monumenta ejusdem insulæ sepulcretis. Minor equidem horum copia; tanta tamen, ut semel & simul describi ac transmitti nequeant. Vix ulla totius Regni Suiogothici pars & provincia *Runarum* tam dives est ac Gothlandia, uti paucissimas quoque esse crediderim, ubi in hunc diem maneant magis Hyperboreorum Vett. ingenium, forma, consuetudo morum, genius linguæ, &c.

Dicam tamen, frustra hinc expectari *Ethnicorum Cippos*. Errant utique, qui *Runas* omnes illis vindicent, aut eas ubique sub Christianismi initia fuisse antiquatas contendant. Reclamat Gothlandia univèrsa. Et tamen illa fuit, quæ, non ausim dicere prima, sed inter primas sub Arcto regiones Christo nomen dedit, monachorum etiam, quæ labes erat illorum temporum, feracissima. Quo igitur argumento dici illi promiscue possint Runarum hostes & carnifices, ut censent nonnulli, ego non video. Sed quidquid ejus sit, nostram saltem hinc excipiendam esse Insulam, res ipsa loquitur; sive quod in continenti fuerint illi atrociores quam in maritimis, sive Gothlandi literaturæ suæ tenacissimi, nullis Cleri papalis precibus minisve flecti potuerint.

Si quis forte crediderit, heri aut nudius tertius vel quintus, hoc est, recentiori ævo hæc produisse Saxa, næ admodum ille fallitur. Ætatem quidem inscriptam non habent, si excipias paucissimos, neque enim hoc ultimæ vetustatis signum esset: at immixta tamen aliis defunctorum monumentis, stilo & literis nimirum Monachorum exaratis addictumque annorum numerum habentibus seculi potissimum XIII. &

XIV. eandem saltim, si non longè majorem, arguunt canitiem. Ad sunt præterea alia antiquitatis indicia haud pauca.

Ad *fitum* quod attinet, id habent peculiare Insulares nostri Cippi Runicci præ ceteris in continenti, ut infixi humo erectique rarissime conspiciantur, sed resupina jaceant humique strata, ritu hodiernorum sepulcralium lapidum, partimque semisupina in dextrum vel sinistrum latus, quod diuturnitati debetur. Neque in campis, agris nemoribusque tanta occurrunt copia ac transmarini, sed in templorum areis & cœmeteriis; ut Christianorum ossa quin sub illis recondantur, nulla omnino sit dubitandi ratio. Accedit, quod non ex rudi, ut illi plerumque in utraque Gothia & Syethia, verum plano, manuque artificis lævigato saxo constant, quale est illud Burgsvicensē in palatia & mausolea Regum migrare solitum. Facit hoc natura soli, non enim omnis fert omnia tellus.

Sæpius optaveram, ut mihi æque felici esse contingerit, ac Rudbeckiis olim, Vereliis, Peringsköldiis, queis pictores publicis sine dubio stipendiis alere, & ubique tecum ducere itinerum comites, dabatur. Profecto tunc multis parasangis venustior prodiret in lucem mea non tantum Gothlandia, rebus utique memorabilibus, si terra sub sole ulla, refertissima; verum etiam hæc, quam sisto, Runicorum cipporum cohors. Quippe si omnia exacte delineata cum suis ornamentis exponere conspectui Lectorum eadem opera licuisset, age sane vel ad agrestium colonorum basilicas obstupefcerent multi, & mirarentur. Γαβλαός, h. est האבנים לבנים ירוקים אוקנים (b), seu Lapididas tam excellentes quondam dari potuisse in Gothlandia.

Ita

(b) Vid. R. Dav. Kimchi ad I. Reg. V. 18. al. 32.

Ita quoque inter monumenta Runica occurrunt subinde ejusmodi, ut si gryphos illos & miros draconum, ceu antiquis mos erat, circumflexus attenderis, non modo Verelianis haud inferiores diceres, sed operam ipsius *שקר* in illis excavandis adhibitam fuisse, crederet facile quivis Apella.

Ordo autem Cipporum nostrorum ut obtineatur certus, ne per insulam hinc inde vagi oberrasse videamur, ipsum terræ situm naturalem sequi statuimus ab aquilone usque ad austrum, *ים ער ים* & *mari ad mare* (c), eundo sic per Tertianas (*Tredingar*), in tot enim partes terra dividitur, atque Paræcias, juxta Tabulam meam typis excusam, ordine tamen utrinque retrogrado. Templâ quidem ecclesiarum a viâ regia magis remotarum (*annexas* dicunt) mihi nonnulla oculis usurpata non sunt, verbi gratia *Hambre*: ejus autem monumenta, si recte meminero, observavit in Itinerario suo Cl. Dn. LINNÆUS. Quæ autem hæc in re defunt, ab amicis transmitti facile possunt, si ita opus sit. Hæc vero quæ trado, aut ipse descripsi manu mea, prona in terram facie, minutissima quæque rimatus, aut a fideli meo tunc temporis in visitationibus Achete & Runognosta perquam perspicaci, hodie Pastore Gothensium vigilantiss. Dn. AND. CEDREN delineata, cum *ἀρχαῖοις* exacte contuli. Doleo tantum tot lacunas, fractis aut detritis faxis, senium partim, partim quoque injuriam hominum peperisse.

Hæc præfaminis loco sufficiant. Fiat itaque exordium ab insula *Fård*, quæ appendix quasi vel si mavis, caput est totius Gothlandiæ, & subsistendum nobis ad promontorium *Hoburgen*, duplici nomine insuperabile, ob præcipitium scilicet & tridentem Nepruni.

A 3

Sed

\* \* \* \* \*

Sed dum ista paro, liceat mihi paulullum ex-  
spatiari extra Gothlandiam, & hoc loco inferere, quæ  
in transitu per *Calmariensem* tractum anno præterito  
observavi, non quidem aliena profus a nostro in-  
stituto.

I. OBSERVATIO  
DE  
*ETYMO URBIS CALMAR.*

**D**Iu multumque, sed frustra hætenus, labora-  
vi, ut copia mihi fieret dissertationis Acad.  
de *Calmaria*, auctore, ni fallor, M. ANDR.  
SVEBILIO, P. & P. hodie Alhemensi. Videre enim  
lubuit, num veram ille nominis affecutus sit origi-  
nem, ne actum agerem. *KALM* Gothlandis hodie-  
que, ut sine dubio antiquis Gothis omnibus, voca-  
tur Collis sepulchralis major ceterisque præstantior,  
faxis ad basin molis vastissimæ orbiculatim colloca-  
tis, et lapidibus laboriosa manu congestis aliis super  
alios, ad conii formam vel pyramidis, in altum ad-  
turgens, in plurali numero *Kalmar*. Hanc vocem  
nec habet VERELIUS in Indice, neque SPEGEL  
in Glossario. Danis vocatur *Dyfs*, Scanis aliquando  
*Kuml*, & Borringis *Kubl* (d). Argumentum firmis-  
simum, Urbem istam a Gothis, non vero ab aliis  
fuisse conditam.

Colles vel tumuli hujus indolis in Gothlan-  
dia maxime memorabiles bini. Alter in paræcia  
*Bro*, tertia miliaris parte distans ab urbe Visby, bo-  
ream

(d) Vid. Wormii Mon. Dan. pag. 113. 121. 201. 227. 262. 339.

ream versus, cujus in medio diameter LXXX pedes conficit, nobis XL *Steg*, h. e. passus seu cubitos; apicem enim et superiora omnia diruerant manus voraces thesauris inbiantium. Nomen ejus aliud nesciunt incolæ, quam *Kalmen*. Insignem autem heic loci Pugilem conditum esse, prodit, præter alia, inscriptio ad latus tumuli lævum majusculis Runis in ipsa solida rupe, quam via pertransit publica. Alter prope portum *Grandsviken* in parœcia *Grötlingbo*, litori vicinus, intuentium oculos implet, utpote illæsus & prorsus integer, cujusque pares vix multos habebit terrarum orbis.

In *Oelandiæ* insulæ parœcia *Köping*, inque confinio arcis *Borkholm*, colles conspexi anno M DCCXL, præcipue quatuor eximie magnitudinis, minime tamen ad idem cum priori pertingentes fastigium. Hic scilicet sinus, freti particula *Oelandiam* (e) dirimentis a *Calmariensi* ripa & *Smolandia*, aptissima olim præbuit piratis receptacula, conflictusque ibi navales & strages testantur memorati jam colles una cum aliis minoribus fere infinitis. Tota illa ora maritima occidentem versus, ubi hodie caput extollit *Calmaria*, quin totidem impleta fuerit caëforum tumulis, quis dubitet; licet deinceps æquati solo, in arcis urbisque munimenta ac decus fuerint translati.

Ætas, qua hæc mutabatur soli ac rerum facies, latet. Id tamen mea persuasione certissimum, regionem istam, ante conditam Urbem, vocatam fuisse à multitudine collium, *Kalmar*, et definitive sive demonstrandi modo, *Kalmarna*. Quippe literam C ignorabant majores nostri Gothi. Dignissimum observatu

(e) In Lexico universali, cœu dicitur, Buddei, perperam *Gotbland* scribitur pro *Öland*, ad vocem *Calmar*.

vatu hoc loco est, veteres omnes scripisse Urbis nomen *Kalmarna* (f), et sic etiam locutos: *Låt ofs fara til Kalmarna: han kom från Kalmarna*, h. e. eamus ad Colles: venit a loco vel territorio *Collium*. Qui latine loquuntur, ob eandem hanc causam rectissime scribunt *Calmariniam* (g), quia voci veterum melius respondet, quam vulgo illud *Calmaria*.

Forfan tamen ob pluralem numerum in *Kalmarna*, curatius Romanorum more, pluraliter quoque diceretur *Kalmarni* et in casu secundo *Kalmarnorum*, ut *Remi, Remorum, Parisii &c. &c.* quamvis nomina ista populorum quondam fuisse non ignoremus. Neque rationem video, cur in Suethica voce exulare non possit peregrinum illud elementum *C*, & ejus loco substitui indigena litera *K* in *Kalmarnia*, eodem si non potiori jure, quam veteres, Græcorum more, scripserunt *Karthago, Kalende, Karisimus*.

## II. OBSERVATIO

DE

### CIPPO RUNICO ÅKERENSI IN SUDERMANNIA.

**E**Um *accurata*, ceu dicitur, *cura* ipse delineavit b. m. JOH. PERINGSKÖLD et exhibuit in annotationibus suis ad vitam Theodorici (h), cum Runis sequentibus:

ᚠᚱᚱᚱ

(f) Conf. Chronicon Rythmicum, & Diplomata RR, ap. Jo. Hadorphium.

(g) Conf. Joh. Magaus, Messenius &c.

(h) Pag. 402. sequ.



1ΨNIT· RHITI· HIF· T· BIMI· ANI· HNIT· HIM·  
 NINOTΨN· 1ΨN· \*RITKI· BRNPNR· HIM· NTRPI·  
 NTI· TTRIBIT· I· FTRΨTRT· HNTPΨT· ΨNRN·  
 1ΨN· HKTIN· \*HIFI· RHITI· RNTT· PTI·

AMVIT RISTI STINA THINA ULLI  
 SUNA SINA, UNULFU, AKU, HRENGI,  
 BRUDUR SINA, WARDI UTI TERI BINA, I  
 GALMARNA, SUTUMA; FURU EFU SKA-  
 NU. ESKI RISTI RUNA THASI.

Lectio Runarum ac verborum distinctio recte  
 per omnia sese habeant, an secus, non magnopere  
 disputamus, lapide nondum viso. At *interpretatio*,  
 ad mentem Nob. PERINGSKOLDII, *genuina* hæc  
 erit:

*Amvit reste thesse stenar åt alla sina söner, samt åt  
 Unulf, Åke och Renge sina bröder, Wårdhällare  
 (Wåringiar) ute i Tyri Stad, i Galileiske hafvet,  
 och Sodoma, hvilka foro ifrån Skånd. Eske ri-  
 stade thesse Runer.*

Versio Latina ejusdem auctoris additur sequens:  
*Amvitus erexit lapides hos omnibus filiis suis, ut et  
 Unulpho, Achoni, ac Rhengoni fratribus suis, qui e-  
 rant Excubitores peregre in Tyro civitate, in Gallico  
 (Galilæo supra mari (seu mediterraneo) ac Sodoma,  
 profecti de Scania. Esko sculpsit hæc literas.*

Obiter observandum! Imo particulas illas, *ut*  
*☪*, *Sueth. samt*, ante vocem Unulpho: *ac*, *och* ante  
 Rhengoni: *peregre* *Sveth. ute*, ante in Tyro: atque  
*ac*, *och* ante Sodoma, non extare in Textu runico, ne-  
 que *Ulli*, sed *Uli*, vel *Yli*. 2:do pro illo *in Gallico*

B

ma.

*mari* (seu *mediterraneo*, NB. neque hoc posterius in textu), juxta versionem Svethicam dici debuisse: in *Galileo mari*. 3:0 Scribi *lapides hos Sveth. thesse stenar*, cum tamen in præcedenti historia seu descriptione, unci tantum lapidis fiat mentio, non purum. Sed quia suo loco motus & ad veteris templi structuram dicitur translatus, socios forte habere primitus potuisset. An vero hæredibus & sculptoribus præcis mos fuerit ita scribendi, alii dispiciant. At levicra hæc sunt. Nos de loco, ubi excubias erint olim milites in Cippo nominati, magis erimus solliciti. Neque reticere debet, PETRUM DIKMAN, <sup>1</sup>*Sen.* in Tractatu de Cippis Runicis (i), in idem istud monumentum Åkerense esse commentatum, & quidem presse inhærendo PERINGSKÓLDII verbis ac versioni, excepta unica voce *Galmarna*, pro qua DIKMANNUS ponit *Galmara*, exclusa litera *n*; ita tamen, ut a *mari Galileo* minime recedat.

Miror et demiror Viros eruditos hoc modo explicare voluisse verba non prorsus obscura & difficilia, *Amvitiq̄ue filios ac fratres*, præter necessitatem, in Asiam usque relegare & lacum Asphaltidis sive mare mortuum. Vox *Kalmarna* in se est perspicua, nam litera *Kaun*  $\Psi$  utrumque et *G* notat & *K* (k). Particula quoque  $\text{NTI}$  sola *in* significat, ut necesse non sit bina inde formare vocabula: *ute i*, hoc est, *peregre in*. Porro, invita Geographia, *Tyrus* in Galilæo mari collocatur, proprie sic dicto, Matth. IV. 18. quod alibi mare Tiberiadis vocatur & lacus Genesfar. Vox denique *Sutuma*, ipsis *Sodoma*, mihi nimis suspecta; nec enim urbs ea, postquam flamma

cœ-

(i) Historiske Anmärkningar öfver Runstenar, pag. 130. &amp; seq.

(k) Conf. Verel. Runograph. Scand. p. 28. &amp; 36.

œlesti semel consumpta erat, iterum exstructa uspiam legitur, quod sciam. Eò ergo mittere e Scania vel Sudermannia excubitores seu custodes, inanis labor est antiquariis. *Vecors esset, qui heic Sodoma a Deo eversta & nunquam postea habitanda intelligi posse sibi persuaderet.* Verba sunt HADR. RELANDI de ficto Episcopo Sodomorum in concilio Niceno primo (l). Liceat insuper ad præsens negotium transferre ejusdem Auctoris verba, Libro citati operis primo (m): *Quis sibi persuadeat debuisse Judæos (ita quoque milites Sudermannos) si verbi gratia in extremis Europæ partibus degerent, in Palestinam ad lacum Asphaltiten proficisci?* Videtur quidem PET. DIKMAN (n) statuere, hanc nostrorum expeditionem fuisse susceptam ante Sodomam everstam, h. e. annum M. C. 2048. sive ante Ch. N. 1923. Verum mei stomachi ea natura non est, ut ista credam. Ceteroquin plurimos ex arctois quoque gentibus, sub expeditionibus olim cruciatis, Pontificum Rom. bullis (o) excitos, in *Terram Sanctam* sæpius abivisse militatum, quis ignoret? Novimus etiam præcos nostros *Waringos* aliquandiu in aula præcipue Imperatorum Constantino Politanorum meruisse, uti hodie mos est carni de carne nostra et ossibus etc. Helvetiis nimirum seu Suetzeris in aulis Regum Galliæ et aliorum; sed hæc nihil ad *Amviti* familiam.

Jam revertor *Kalmarniam*, certa spe invenienti veram lectionem genuinumque sensum dicti *Lapidis Åkerensis*. Tanta ista urbs vetustatis *ὑπεροχῆ* gaudet, ut ejus incunabula sive primam originem

B 2

nemo

(l) Palæstin. Lib. III. pag. 1120.

(m) Pag. 236.

(n) Loc. cit. pagg. 11 & 131.

(o) Vide eas apud Joh. Vastovium post vitæ aquil. edit. Colon in. Fol.

nemo adhuc certo potuerit explicari. Seculo post N. Ch. jam duodecimo ita percrebuerat fama ipsius, ut vel Arabibus esset notissima (p). Quod si, juxta PERINGSKÓLDIUM loco cit. supra memoratus Cippus sepulchralis *temporibus paganicae superstitionis* fuerit incisus, quod haut difficulter crediderim, quia voto Christianorum destituitur (\*), muro præterea antiquissimi & sub Christianismi exordia conditi templi, senio dudum collapsi, dictique *Ária* (q), incrustatus; possent utique urbis initia ad multa retro secula adscendere. Et id quidem postulat situs ac indoles loci peropportuna, siquidem clavis olim et clausura regni Svio-Gothici erat ab illa cœli parte. Si etiam fides habenda JOH. MAGNO (r), floruit *Kalmarnia* sub exitu Gothorum, deinceps Longobardorum, è Scandia in Gothlandiam, &c. ducibus Achone (Ajone alii et Oggone) atque Ibbone, id est, anno a Nativitate Christi CCC LXXXII. ceu affirmat ALB. KRANZIUS, vel anno sequenti, ut JACOBUS GISLONIS.

Ab hac urbe proficiscentibus Occidentem versus, tertia tantum milliaris parte confecta, occurrit templum et parœcia *Dórby*, Præbenda, ceu dicitur, Calmariensis Episcopi. Hæc per octiduum commoratus fui anno proxime præterlapso, apud viduam beati mei affinis & Episcopi D. HERM. SCHRÓDERI, dum valedicta Gothlandia trajectoque æquore, adventum Regis nostri clementissimi præstolabar, antequam Gothoburgum pergerem, ibique in eodem tem-

(p) Vid. ex Geographia Nubiensi Diss. nostram acad. de Sigtuna, pag. 344.

(\*) Nisi *Dur* punctatum prohibeat, &c.

(q) Forte *S. Órjan*, sic n. vet. appellarunt *Georgium Eq.*

(r) Hist. Su. Goth. Lib. VIII. Cap. 17. Conf. Paulus Warnefridi de Gestis Longob. Lib. I. Cap. 3. et sequ.

templo, vacante adhuc Episcopali sede, rogatus binos S. Th. Candidatos sacro ordini initiavi ipso die festo *Joh. Baptista*. Non procul hinc vestigia olim arcis sive *Castelli* antiquissimi, cujus et nomen et memoria apud accolas perierè. Utrum ante vel post conditam ad litora maris Kalmarniam urbem, illud magis fuerit in usu, difficile dictu. Quin autem nomen *Dôrby* sive *Þyriby* (s) olim obtinuerit, vix dubitare licet, quia I:º idem nomen a castro scilicet, procul dubio, Ecclesia supra memorata seu templum, fortassis etiam locum, mutuo acceperat. II:º *Tyriby* commode reddi potest *fortium virorum sedes*, sive castrum, fortalitiu, *Fortresse* Gall. Quippe *Tyr* majoribus idem ac fortis, audax a *tyras*, hodie *tôras*, audere (t), *AUDENTES fortuna juvat*, Virg. (u) Ill:º pondus non minimum conjecturæ addit prætens Åkerensis in Sudermannia lapis, in quo **↑IRIBI Teribi** vel *Derbi* optime nostro hodierno *Dôrby* respondet. Nam litera **↑ Tyr** dicta, h. e. Rom. **T**, pro *D*. etiam usi sunt Runographi (x), & *Is* sæpius abundat in media voce. *Excubitores* certe, quales hi erant Amviti filii & fratres, præsupponunt *Castellum*, ubi egerint excubias; at castellum vocatur *Terebi* vel *Dôrby*. Additur expresse situs: *na i Kalmarna*, h. e. prope Kalmarniam, vel si nondum urbs extitit, ad præaltos emortuorum tumulos. Satis quidem hæc, opinor, perspicua.

Addere tamen necesse est, stetisse quondam prope Kalmarniam, Castellum *Kleckenberg* vel *Cler-*

B 3

ke-

(s) Ut *Þyribeif* apud Norvegos, & *Thyri* regina, Snorro Sturl.

(t) Vid. Verelii Not. ad Herv. Sag. p. 49.

(u) *Æneid*, Lib. X. p. 365.

(x) Conf. Verel. Runogr. pagg. 31 & 36 &c. nec non exempla in Actis Lit. Suet. an. 1730. p. 89.

*keberg*, scribitur quoque *Kekkeberg* & *Klekeborg*. Notes Templum nomine *Kleckeberga*, eodem fere loco, hac nostra etiam ætate, conspici & a parœcia-nis ejusdem nominis frequentari. Fit autem veteris propugnaculi hujus mentio in rebus gestis Ducis Engelberti, circa annum M CD.XXXVI. *Progressus inde ad Calmariam, negato sibi introitu, posuit NB. custodes in Kleckenbårg*, inquit ERICUS OLAI (y). Causam addit Chronicon Rhythmicum (z):

*Han lot Nils Stenfon Clec ebårg taga  
Och gôra the Borgare (i Calmarna) ther aff aga.*

Et post pauca:

*Vppå Clerkeberg laden Bengt Gotskalkson, (a)  
Sva ok Gostaff Laurentzon,  
Måder them sva manga svena,  
Calmarna skulde the Landet mena.*

Post obitum Regis CAROLI KANUTI, Prorex Steno, negata Kalmarnia, præsidia eidem castello imposuit, ut idem testatur Chronicon (b):

*LX han lade pa Kekkeberg NB. fasta,*

*Sed mox  
Konung Christiern för Klekeborg drog,  
Och thet alt niderflog. &c.*

Ultima tunc fata id vidisse hinc facile existimassem, nisi JOH. LOCCENIUS, sub R. GUSTAVI I. imperio ejus meminisset (c). Verum hoc, de quo  
jam

(y) Hist. Su. Goth. Lib. V. pag. 370

(z) Rim-Krön. pag. 233.

(a) Erico Olai p. 370. vocatur *Godseale Bengeson*.

(b) Pag. 502.

(c) Hist. Svec. Lib. VI. p. 338.

jam verba fecimus, unum esse & idem cum superius nominato propugnaculo, crediderim, et aliquando *Dörby*, aliquando *Kleckeberga*, pro arbitrio nuncupatum. Situm enim fuit intra terminos utriusque ecclesiæ & *Dörby* et *Kleckeberg*, utpote quæ ambæ sunt vicinæ, sub uno insuper eodemque etiamnum Pastore copulatæ sive connexæ, atque Episcopales.

Restat vox *Sutuma*, cujus explicationem quamlibet aliam lubens admittere velim, modo non degeneret in *Sodomam*. Notabat alias *Syta* antiquis Gothis lugere, plangere, *Sut* idem ac luctus, et *Sutfullur*, mœrore plenus. *Sot* autem cum *o*, æque ac hodie, morbum significabat. Sensus forsan verborum est, nominatos milites ex prælio quodam in *Scania* revertis, in *Dörby Kalmarnorum* fuisse extinctos; quibus suis pignoribus istud monumentum, reperlata, inter luctus & suspiria posuerit superstes *απαις* *Amvitus*.

Sed clariora forsan adhuc & magis verisimilia de illa voce *Sutuma* dabo, coronidis loco. Freto Calmariensi, nobis, immo exteris, *Kalmare-fund*, quid quæso, terra marique notius? Nil prorsus, si ve præfens respicias ævum, si ve remotissima abhinc tempora, plurimasque retro annorum centurias, ne dicam millenarios. Quid igitur obstat, quo minus *𐀀𐀃𐀆 Sut* scriptum heic sit pro *𐀀𐀃𐀆𐀆 Sunt* sive *Sund*, fretum, ut plene *𐀀𐀃𐀆𐀆 Sundi* in binis lapidibus apud Verelium (d). Litera enim *+* *N* sæpe in hac literatura obsorbetur e. g. *Iglat*, *Irlat* & *Gutlat*, pro *Inglad*, *Irland* & *Gutland*. Potuisset etiam scribi *Sundum*, terminatione in *um* apud priscos usitatissima; sed necesse non est, eo confugere. De  
cete-

(d) In Runograph. Scand. pag. 35. & 45.

cetero, quia eo tempore nondum forte condita urbs fuit Kalmarnia, ergo *a freto*, litora alluente *Collium*, fit denominatio. De voce **NRPI** *vardi*, esset quidem nonnihil monendum, sed mitto. Forte singularis quoque, loco pluralis numeri, in *lapidibus & filiis*, salva, si quæ fuit Runographorum Grammatica (e), ut et **INK** *auk*, h. e. copula *ok, et*, levi literarum transpositione, pro nomine proprio **INK** *Aku*, posset substitui.

Interea, istis præmissis ac fortasse concessis, verborum in *cippo Akerensi* lectio, sensus ac interpretatio hæc, quæ sequitur, omnium facile foret simplicissima; at salvo tamen semper aliorum iudicio:

4PNIT. RHTI. HIM. BIM. AN. HNT. HIM.  
 NINPN. INY. \*RITVI. BRNPNR. HIM.  
 NRPI. NTI. TRIBI. T. I. YTYTRT. HNT.  
 NY. T. PNPN. IN. HPTN. THVI. RHTI.  
 RNT. PTHI.

NB. Linea prima, voce 2 deest | et in 3. ↑

Ver-

(e) *Stin, Stain* vel *Stun*, Lapis, est quidem plerisque Cippis sing. num. sed invenitur etiam *Staina & Stino thisi*, h. e. hunc lapidem; sic *denfa* vel *thinsa*, & *dina* vel *thina*, hunc. Atque licet Pet. Dikman, Runognosta eximius, dicat pag. 108. 121. *Thonsi* significare thenna, hunc, at *Thisi* thessa, hos; pag. tamen 86. occurrit *Stino thisi* in singulari. Sic quoque p. 117. *kumb thisi*. Hinc adparet, priscorum Grammaticam non ubique sibi fuisse constantem. Quod vero ad alterum illud *sun sin* attinet, quod Nob. Peringsköld reddit per *filiis suis*, utique in hoc lapide non nisi unus nominatur filius sc. *Thi* vel, ut puto, *Olaus*. Aut si plures habuisset Pater, eosque milites, procul agentes patria, hostibus milleque periculis expositos, ac forsitan jam tum interemptos, atque ob hanc causam si **ANI** exponendum esset per omnes; cur igitur *fratrum* potius recitavit, quam *percara filiorum nomina*? alias minime negamus, *sun sin* rectius dici de filio u-



Verfio Suethica.

*Amuit reſte ſten denna åt Yli (ff) Son ſin, Unul-  
fu ok Hrengi Bröder ſina, vårdballare uti Teribi (Tör-  
by), na i (bredewid) (gg) Kalmarna-Sund, um a furu  
efu Skanei (ſom dit forö ifrå Skåne) (hh). Elki ri-  
ſlade runor deſſa.*

Verfio Latina.

*Amuitus erexit lapidem hunc Olao filio ſuo, Unul-  
fo & Hrengio fratribus ſuis, Excubitoribus (ſive mor-  
tuis) in Dörby, prope Kalmarnienſe fretum, qui eò  
profecti erant e Scania. Eſgerus (ii) ſculpſit runas has.*

Gothobürgi,

d. 2 Aug. 1746.

nico: nihilo tamen minus & hæc regula admittere videtur exceptio-  
nem, quia in Cippo Norbyenſi & parœcia Bond-Kyrka legitur:  
*Siguidr ſun Kilaugar raiſti Runar iſtir Ragnilſi* (en unicum) *SUNU  
SINA*, h. e. Filio ſuo. Porro pag. 151. apud Dikm. de pluribus  
filiis dicitur *ſuni ſini*, non vero uti heic *ſuna ſina*. Non miror.  
Habuere ſculptores olim ac ſcribæ ſuam quiſque dialectum, ſuam  
ſcribendi licentiam & rationem, ſua etiam ſermonis vitia. Magis  
mirum, nos hodie in tanta luce non convenire.

- (ff) Potius *Yli*, quam *Uli*, eſt enim *U* ubi cum puncto, inventum re-  
centioris ævi. Minime *Ulli*. Idem ſ. d. nomen, ac hodie vulgo *Olle*.  
(gg) Illud *na i*, idem eſſe credo ac *na bi* vicinorum, in ſup. Germ. *Nabe  
bey*, h. e. hart när, vel ſtrax-f. bredwid, in wid, haud procul, prope.  
Multa enim verba, nobis obſoleta, apud illos remanent.  
(hh) *Um* ſæpe occurrit in Cippis pro *ſum*, ſom, hwilke. Cfr. Dikm.  
p. 55. 123. & 154. Sed *A* uſurpatur pro *til*, *på*, *uti*, *dit*. *Fara a  
burt*, hodie *fara bort*, proficiſci.  
(ii) Ut *Eſgerus Jucl*, A. ep. Lund. anno 1310. vulgo ſcribitur *Eſge &  
Eſke*.



C

OB-

OBSERVATIONES ECLIPSIUM  
SECUNDI SATELLITIS JOVIS,  
A DIVERSIS ASTRONOMIS HABITÆ;  
EX QUIBUS THEORIA MOTUUM EJUSDEM  
SATELLITIS EST DEDUCTA,

A  
PETRO WILH. WARGENTIN.

---



rodeant jam, ad exemplum Primi, omnes, quas colligere potui, observationes Eclipsium Secundi Planetæ Circum-Jovialis. Sunt illæ numero decem quadringentæ, quarum octoaginta sex habitæ sunt in Observatorio *Pekimensi*: septuaginta novem in *Parisiensi*: septuaginta duæ in *Petropolitano*: triginta septem in *Grenovicensi*: undeviginti in *Bononiensi*: sedecim in *Upsaliensi*: sex in *Berolinensi*, & una juxta novum observatorium *Stockholmiense*. His adjunxi triginta tres, in Reductione *S:æ Cosmæ* in Paraguarua; octodecim *Ingolstadii*; quindecim *Upminstri*; duodecim *Romæ*; sex *Southowici*; quatuor in insula *Martinica*; tres *Torneæ* & denique tres *Madridi* institutas. Si ad ditissimam observationum Parisiensium gazam aditus mihi patuisset, non tantum series hæc futura fuisset locupletior & magis continua; sed ipsæ quoque Tabulæ certiolem polliceri calculum potuissent: cum autem non nisi paucas earum sparsasque editas invenerim, mirum æquis rerum censoribus haudquaquam videbitur, si Tabulæ non dum omne ferire punctum sustineant.

Paucissimas observationes exclusi, easque vel ab ipsis auctoribus inter dubias relatas, vel quas erroneas esse, aliarum eclipsium, eodem tempore notarum, analogia arguit. Inter has emerfio, die 15 Junii, anno 1684, itemque Immerfio, die 18 Novembris ejusdem anni, quas *Parisis* observatas in *Historia Cælesti* recenset Cl. D. LE MONNIER, vix & ne vix quidem recte se habere possunt, licet dicere nequeam, in quo consistat fallacia. Eodem modo Immerfio, die 13 Augusti, 1738, *Petropoli* visa, licet solita industria celeberrimus observator usus fuerit, non tamen potest non esse erronea: aliæ enim immerfiones eodem anno observatæ sunt, uno alterove minuto citius, quam ex calculo contingere debuerant; hæc sola totis undecim minutis calculum anticipisse traditur, quod nequitiam fieri potuit; nunquam enim tantos tamque subitaneos saltus facere consuevit Secundus. Suspicio immerfionem non h. 10, m. 17, s. 43, sed 10, 27, 43 contigisse, tum enim res est in vado, consentientibus inter se observationibus. Talis hallucinatio inter excerptam ex diario observationem facile potuit obrepere. Similis hallucinatio exciderit quoque necesse est illustri FLAMSTEDIO, in Immerfione, die 7 Augusti, anno 1701, *Grenovici* notata: non enim h. 13, m. 44, sed 12, 44 legendum est Satellitem in umbram esse ingressum, calculo tempus eclipsios h. 12, m. 47 evidenter satis monstrante.

Fuerunt observatores, qui ad eclipses Secundi Satellitis advertere neglexerunt, eam fortassis ob causam, quod solum Primum Longitudinibus locorum Geographicis rite determinandis idoneum existimaverunt, tres superiores Satellites, vel ob tarditatem vel incertitudinem motuum, huic usui parum intervire judicantes. Sed plurimæ observationes correspon-

dentes in hac ferie occurrunt, quæ notas aliunde meridianorum differentias egregie confirmant, & ea re ostendunt, Secundum Primo non multum cedere, si usum Geographicum spectes. Exempli loco sit Immersio, die 14 Junii currentis jam anni 1748, Upsaliæ ab observatore Astronomiæ Regio Celeberrimo, D. HJORTER, & *Parisiis* a D. DE L'ISLE simul observata, quæ differentiam Meridianorum veram quam proxime attingit. Sic emersio nuperrime, die videlicet 6 Octobris, *Stockholmia* a D. ELVIO notata, collata cum correspondente Upsaliensi, satis evincit, differentiam temporis, inter Meridianos Observatorii Upsaliensis & Stockholmiensis haud esse minorem duobus minutis cum dimidio: quod observatæ utrobique eclipses Primi Satellitis & occultationes fixarum a Luna itidem comprobant. Fateor quod Secundus non semper differentiam meridianorum in minutissimis partibus veram subministret: Sed nec ipse Primus semper exactissime desiderio satisfacit, & si ille paulo magis errori est obnoxius quam Primus, id qua partem telescopiorum, quibus diversi utuntur observatores, diversitati esse tribuendum opinor, quæ observationes superiorum Satellitum plus afficere debet, quam inferiorum. Quidquid sit, Secundo aliquas consecrassè vigiliis, nullum Astronomorum pœnitebit. Neque enim motuum incertitudo quemquam absterre-re debuerat, præterquam enim quod non nisi diligenter observando, errores Planetarum detegi & corrigi possunt; tota hæc observationum cohors testatur, Secundum non usque adeo esse irregularem, quin ejus motus in ordinem redigi possint, modo accedat diligentia in observando & calculando indefessa. Certe non ille jam a meis numeris longius recedit; quam Primus ab antiquis Tabulis.

Juxta

Juxta quamlibet observationem, apposui calculi, ex meis Tabulis subducti, errorem in excessu vel defectu, ut ictu quasi oculi deprehendant harum rerum curiosi, quam prope metam hæc assequantur, quibusve temporibus & circumstantiis adhuc vitio laborent. Quod ut eo facilius procedat, præcipua Tabularum elementa ad observationum amussim examinare, & theoriam motuum hujus Satellitis breviter explicare constitui, simulque indicare, ex quibus fontibus emanare suspicor errores, quibus Tabulæ sunt adhuc affectæ.

Et quidem primo, tota observationum series, attentis lustrata oculis, testimonium præbet sat evidens, motum Secundi medium vitii esse immunem: nam inter observationes antiquas pariter ac recentiores, mixtæ sunt æquali fere numero, modoque simili, quæ a calculo in excessu recedunt & quæ deficient, quod non contingeret, si in motu medio error latitaret. Elegantissima illa observatio, quam *Bononiæ*, die primo Januarii, anno superioris seculi sexagesimo octavo, habitam, summo Astronomo, CASSINO debemus, quæque, dummodo moram eclipseos ex ipsa observatione correxeris, optime Tabulis congruit, collata cum simili observatione, post septuaginta duorum annorum intervallum, die 15 Februarii, anno 1740, *Parisiis* instituta; motui medio Satellitis statuminando apprime fuit conveniens. Effluxerunt, inter illas observationes, dies 26342, horæ 22, minuta 44, secunda 9, quibus inter integras Satellitis revolutiones, interea temporis peractas, 7412, partitis, provenit mensis Synodicus seu revolutio Satellitis media ad centrum umbræ Jovis, dierum trium, cum horis 13, min. 17. sec. 53, tert. 45, qu. 7. Unde porro levi negotio deducitur tempus Periodicum d. 3,

hor. 13, m. 13, l. 42 circiter. Quod autem Astro-  
nomus laudatissimus, P. GRAMMATICUS, ex ea-  
dem illa Bononiensi observatione, motum medium  
tam enormiter exorbitantem derivaverit, inde factum  
est, quod illam non *Bononie* sed *Parisis* observatam  
esse, nescio qua oscitantia sibi persuaserit.

Nec in Epochis corrigendis multum proficies.  
Si enim non nullas observationes epochæ aliquantulum  
auctæ juvant, alias & forte non pauciores in de-  
via magis ducent. Si tamen alia quædam Tabula-  
rum Elementa simul correxeris, radices etiam medio-  
rum motuum aliquam admittere possunt emendatio-  
nem, sed exiguam.

Quod in annotationibus super editas observatio-  
nes eclipsium Primi Satellitis asserui, idem nunc re-  
peto, nempe quod æquatio illa Satellitum magna,  
quam Numerus A indigitat, omnium maxime sit su-  
specta, & errorum scaturigo fertilissima. Præsuppo-  
nit illa theoriam motuum ipsius Jovis, omnibus nu-  
meris absolutam, quæ adhuc est in desideratis. Ne-  
que enim justa orbitæ Jovialis excentricitas, nec mo-  
tus locusque Aphelii satis sunt explorati; ne dnm e-  
victum credo, excentricitatem esse constantem & mo-  
tum aphelii æquabilem. Fieri etiam potest, ut mo-  
tus illius Planetæ, ob causam quampiam ignotam, in-  
terdum perturbatus sit. Quidquid sit, ipsum Jovem  
culpæ neutiquam esse expertem, quod ipsius affectu  
interdum in devia delati videantur, illi mecum judi-  
cabunt, qui consideraverint, illos plerumque omnes,  
si aberrant, similiter fere & pro rata velocitatis parte  
aberrare, nec tamen in iisdem orbitæ Jovialis locis,  
similibusque circumstantiis errores cujuslibet Sa-  
tellitum esse æquales vel similes. Sic ab anno  
1674 ad annum 1681, itemque ab anno 1704 ad a.  
1728,

1728, omnes Lunulæ Joviales tantum non semper fuere retardatæ, eclipsinque tardius passæ, quam ex calculo debuerant. Anne hoc Jovem iisdem temporibus acceleratum arguit? Reliquis annis, & præcipue ultimo hoc decennio, sæpius magisque accelerati fuere Satellites, quod retardato aliquantulum Jovis motui tribuendum reor. Aliquam certe partem hujus inæqualitatis ipsi primario deberi non dubito. Reliquam culpæ partem, Secundariorum propria excentricitas, nondum satis comperta, sibi vindicat. Et quod secundum in specie concernit, cujus jam enucleanda theoria; abunde ex observationibus patet, eum non in iisdem Jovis ab aphelio distantis æqualiter semper aberrare, adeoque Tabulam XIII:m, quæ restituendis inæqualitatibus; a Jovis motu oriundis, destinata est, omnibus observatis accommodari non posse, quomodocunque demum efformetur. Si enim æquatio in Tabula ista, male esset distributa, vel si quantitate peccaret; iidem errores in iisdem Jovis ab aphelio elongationibus semper recurrerent, quod repugnat experientiæ, cujus aliqua non pigebit afferre exempla. Annis 1715 & 1716 calculus secundi haud parum in defectu peccat: post annos duodecim, cum rediret Jupiter ad eadem orbitæ suæ loca, annis videlicet 1727 & 1728, calculus quidem adhuc deficit, sed longe minus. Post aliam Jovis periodum, annis nempe 1739 & 1740, in iisdem locis sæpius abundat calculus. Quoties Jupiter, ab aphelio ad perihelium pergens, versatus est paulo infra distantiam a Sole mediam, pulcher admodum consensus inter observationes & Tabulas fuit deprehensus, ut videre licet ex observatis annorum 1724 & 1736: anno autem 1748 haud exigua in iisdem fere circumstantiis obtinuit discrepantia. Annis 1672 & 1684, itemque annis 1731 & 1743, Jove suo aphe-

aphelio imminente, Secundus justo citius plerumque umbram fuit ingressus: Anno tantum 1720, in eodem fere situ, Satelles insigniter fuit retardatus. Eadem igitur invariata manens æquatio, omnibus observatis non quadrat. Mihi incubuit majori observationum parti eam accommodare, ideoque æquationem paulo majorem constituere necessum habui, quam excentricitas orbitæ Jovialis postulat. Ex ea enim excentricitate, quam omnium recentiorum Astronomorum maximam ponit D. DE LA HIRE, maxima æquatio A secundi Satellitis foret hor. 2, m. 39. Juxta Tabulas recentissimas Cl. CASSINI, elegantissimis observationibus superstructas, æquatio A major h. 2, m. 36. esse non deberet. Sed tam exigua æquatio inæqualitatem secundi duodecennalem non exhaurit, observationes enim, saltem pleræque eam duabus horis, 42 minutis non minore requirunt, quantam quoque Tabula XIII:<sup>a</sup> exhibet. Si hæc tota Satellitis æquatio, excentricitati orbitæ Jovialis esset referenda, foret Jovis æquatio maxima quinque grad. 44 min. cui hypothesei observationes circa Jovem ipsum institutæ, refragantur, quæ eam 5 g. 30 m. vix majorem admittunt. Ut itaque in concordiam redigatur theoria Jovis cum motibus Satellitis, nulla alia superesse mihi videtur ratio, quam ut ponamus æquationem illam magnam Tabulæ XIII:<sup>æ</sup>, ex duabus esse conflata, ejusque majorem partem, horas nempe 2, min. 36 deberi excentricitati orbitæ Jovis; reliqua sex minuta excentricitatis orbitæ ipsius Satellitis esse indicia: ea tamen cum conditione, ut locus apogei Satellitis coincidat cum loco Aphelii Jovis, & cum eo communem habeat motum. Cum itaque in illa hypothesei utraque æquatio similis sit, eademque revolvat periodo, ut calculum in compendium mitte-

rem,



rem, conjungendas censui, usque dum plures instituentæ observationes veram excentricitatis Satellitis quantitatem, apogeique locum & motum exactius definiant. Fieri enim facile potest, ut apogæum Satellitis ab aphelio Jovis aliquantulum sit remotum, propriumque & fortassis inæquabilem motum habeat: cui conjecturæ, fidem facit non tantum secundariorum Planetarum, naturæ legibus conformis, theoria, sed & quarti Satellitis documentum, cujus apogæum hoc tempore a loco aphelii Jovialis octodecim fere gradus est remotum, cujusque linea apsidum peculiari quodam sed inæquabili motu, secundum signorum seriem, fertur, ut versus finem hujus seculi parallelissimum cum linea apsidum Joviali tandem affectura videatur. Ignoratio autem veri loci apogei secundi Satellitis, causâ esse potest præcipua dissensus illius, qui etiamnum inter observationes & calculum intercedit. Interim hoc certum manet, secundi Satellitis orbitam esse ellipticam, licet excentricitas valde parva sit, & vix octodecim partes superet, quælium semi-axis major 1000 continet. Sed excentricitas Quarti haud est contemnenda utpote, quæ excentricitatem orbitæ Planetæ Veneris superat.

Uterius evincere conabor, penintimum Jovis Comitem non minus quam intimum agnoscere & confirmare propagationem radiorum luminis successivam. In illo argumento mihi non opus est esse prolixiori, tota enim hæc observationum series, vel nullo interprete, rem conficit, modo indicaverim, me, in supputandis omnibus observationibus geminas illas Tabulæ IIIæ æquationes adhibuisse, & sine illis motum secundi nullo modo cum Tabulis posse conciliari, illarum autem correctionum ope satis apte restitui. Patet hoc præsertim illis annis, ubi multæ obser-

D

obser-

Observationes per octo pluresve continuos menses habitæ sunt, quibus pro majore vel minore Jovis a Sole elongatione, cuivis observationi competente, inæquales applicui ex Tabula Tertia correctiones, & error calculi nihilominus ubique est fere æqualis & similis. Videamus elegantissimas observationes, annis 1715 & 1716, ab Astronomis Parisiensibus habitas: Calculus toto isto biennio duobus minutis in defectu peccavit, adhibitis correctionibus, quas propagatio radiorum successiva exigit: illis autem neglectis, longe magis & non semper æqualiter discrepat. Quod ut manifestum fiat, earundem observationum præcipuas afferre lubet, cum errore calculi, per reliquas tabulas correcti, omiſſa tantum æquatione Tabulæ Tertiæ, ut hujus necessitas & usus tanto clarius innotescat.

	D.	h.	'	"	'	"
1715. Jul.	11	12	38	8.	14	6.
	18	15	11	27.	12	15.
Aug.	12	12	15	33.	9	51.
	19	14	52	20.	9	1.
Sept.	20	14	40	55.	5	0.
Octob.	22	14	30	15.	3	16.
Dec.	4	8	19	4.	2	27.
1716. Feb.	6	7	52	49.	11	58.
	Apr.	10	7	52	30.	17
Jul.	11	15	5	56.	18	14.
Sept.	6	11	48	3.	12	48.
Octob.	8	11	24	1.	4	45.

Jupiter, a mense Julio, 1715, propius propiusque ad Tellurem accessit, usque ad initium Novembris, cum Soli esset oppositus, adeoque Telluri proximus: eodem tempore Ecliptes secundi citius citiusque apparuere. Post Novembrem, iterum a Jove sensim recessit Tellus, usque ad Aprilem anni sequentis: pro aucta distantia Jovis & Telluris, eclipses quoque Secundus serius seriusque celebravit, hypothesi propaga-

pagationis successivæ radorum luminis prorsus conformiter. Idem omnibus annis usu venire, constans docuit experientia. Sicubi minus congruere hypothefi huic, si modo hypothefis nominanda est tot argumentis corroborata veritas, una vel altera observatio videatur, id sine dubio aliunde possuit. Quin & illæ ipsæ observationes annorum 1677, 1694, 1695 & 1696, quas Cl. MARALDUS ut propagationi luminis contrarias proposuit, cum meis numeris egregie conspirant. Quod autem eadem observationes cum explicatione Rœmeriana adversa fronte pugnare MARALDO visæ sint, quas ego mire consentientes monstro; Tabulæ minus absolutæ, & præcipue ignota MARALDO æquatio illa nova C, in causâ fuerunt, quam nunc explicare aggredior.

In examinandis observationibus Primi & Secundi Satellitis, cum Tabulas elaborare inciperem, mox apprehendi, esse præter duas antea cognitâs inæqualitates, ab excentricitate orbitæ Jovialis & propagatione radorum successiva derivatas, in motibus harum Lunularum aliam quandam inæqualitatem, quatuordecim circiter mensium periodo redeuntem. Postquam assiduis tentaminibus quantitatem, periodum atque indolem harum inæqualitatum assecutus utcunq; fueram, æquationes binas empiricas construxi, unam, scilicet Tabula VIII:a comprehensam, pro restituendo Primo: alteram Tab. XIV:a pro Secundo. Utriusque eadem fuit periodus dierum 437; sed quantitate differebant, & id præterea imprimis attentione dignum videbatur, quod iis temporibus, quibus acceleratus erat motus Primi, semper esset retardatus Secundi, & vice versa. Causam harum inæqualitatum indagare, diu multumque sed frustra annisus sum. Satis quidem probabile vide-

batur, cauffari illas ex attraCTIONibus feu gravitationibus mutuis corundem Satellitum; quibus fuos invicem motus perturbant, quemadmodum motus Lunæ ab aCTIONibus Solis perturbari, Astronomis jam diu innotuit, præcipue quoniam, eadem 437 dierum periodo, Satellites istos ad eundem fecum invicem & cum Sole atque Jove fitum redire, compertum sibi antea habuerint Astronomi. Commertium autem quod illos intercedit, distinctius enucleare, & nexum inter cauffas & effectum, ex notis motuum legibus demonstrare, vel saltim a posteriori commertii istius genuinam indolem ostendere, nullus adhuc potuit. Anno demum superiori, casu quodam animadverti, iis temporibus, cum ambo hi Satellites umbram Jovis simul intrant, adeoque a centro Jovis visi sunt conjuncti, Numerum C Primi semper esse circa 750, adeoque æquationem esse in maximo suo decremento, quod Satellitem tum maxime acceleratum innuit: Numerum autem C Secundi eodem tempore semper esse circa 250, qui æquationem maxime crescentem, & per consequens Satellitem maxime retardatum arguit. Hæc indicia toti isti commertio inquirendo & investigando ansam dederunt. Et cum res nova sit, non ingratum Uranies cultoribus fore spero, si eam uberius explicavero. A Primo incipiam, cujus observationes, per octoaginta annos habitæ, constanter docuerunt, eum esse acceleratum, quoties eclipsin patitur, cum Secundo in ipsa Jovis umbra conjunctus. Contingit hoc quotannis, numero C a 700 ad 800 pergente. Sit jam in figura I.a, J, Planeta primarius Jupiter. *ADad* orbita intimi Secundarii; *GLgl* orbita penintimi: Sit Sol in directione lineæ *GS*, versus *S*; Satellites igitur in oppositione cum sole, adeoque in umbra Jovis versantur, quoties ad *A* & *G* accedunt,

dunt. Ponamus jam eos aliquo temporis momento ita esse conjunctos: mox pergit primus in sua orbita per *CEce*, & absoluto mense Syndico redit ad umbram *A*; interea Secundus, cujus motus est duplo tardior, per *K, M*, migravit ad *g*, adeoque oppositus est Primo in umbra constituto ad *A*. Nihilominus Primus, est adhuc acceleratus, fere ut in eclipsi præcedente. Hinc statim concludere fas est, eum tam in conjunctionibus quam oppositionibus cum Secundo esse acceleratum. Confirmant hoc observationes Primi longe plurimæ. Citare sufficiat eas, quæ mense Decembri Anni 1727, & Januario 1728 habitæ sunt: tum enim Primus alternis vicibus conjunctus & oppositus Secundo fuit, sed tamen semper acceleratus. Si periodus Secundi exacte dupla esset Primi, eodem modo alternare pergerent. At Primus  $10\frac{1}{3}$  minutis temporis citius unam absolvit revolutionem ad *A*, quam Secundus dimidiam ad *g*, & Primus viginti minutis temporis citius duas, quam Secundus unam: & ille  $41\frac{1}{3}$  minutis citius quatuor perficit menses synodicos, quam hic duos, atque sic porro, qua re fit, ut Secundus non continue conjunctus vel oppositus sit Primo, eclipsin patienti, sed a Zyzygiis paulatim migret. Post unam enim revolutionem, redeunte Primo ad *A*, Secundus nondum ad *g* accessit, sed versus *N* tres quartas partes unius gradus, quæ nempe decem minutis temporis in orbita Secundi respondent, ad huc est remotus. Cum post duas revolutiones umbram ingreditur *I*: ad *A*, Secundus non dum integram absolvit, sed versatur a *G* versus *n* sesquialtero gradu remotior. Quatuor revolutionibus *I*:i peractis, Secundus non integras duas percurrit, sed tres fere gradus adhuc perficiendi restant, antequam *G* attingat. Hoc modo qualibet revolutione Primi, Secundus

magis magisque a conjunctione sua G versus n, m, & ab oppositione g, versus N, M migrat, donec post septem menses circiter (quibus I:s integras 123 revolutiones absolvit, & Secundus dimidias 123, quarum tamen ultima deficit 90 gradibus, accumulatis sensim ex dicta II:di retardatione pro qualibet Ii revolutione) eclipsin patiente I:o in A, Secundus sit ad L, adeoque in quadratura cum Primo: finitis autem revolutionibus Ii 124, II:s non nisi dimidias 124, deficientes 90 circiter gradibus, percurrit, quo fit, ut, Primo in A existente, versetur Secundus in altera quadratura, juxta l. Videmus igitur Secundum paulatim ab alternis oppositionibus & conjunctionibus cum Primo discessisse, ad N vel n, deinde ad M vel m, donec, finitis dictis septem mensibus, tempore obscurationis Ii in A, migravit II:s ad alternas quadraturas L vel l. Iisdem mensibus celeritas quoque intimi Satellitis, quæ ceteris paribus, maxima erat, Secundo in Zyzygiis constituto, sensim diminui confuevit, pro ut ab iisdem Zyzygiis magis magisque migravit Secundus, usque dum, hoc ad quadraturas delato, illo temporis momento, quo ille umbram subit, motus Primi fiat, ceteris paribus, omnium tardissimus. Quoties numerus C primi Sat. a 200 ad 300 pergit; hujusmodi inter illas Lunulas configuratio obtinet, nempe ut commorante I:o in umbra, Secundus sit in alterutra quadratura seu maxima digressione: tum etiam æquatio C Tabulæ VIII:æ maxima capit incrementa, quod argumento est, Primum esse maxime retardatum. Testes provoco observationes in fine Decembris, 1730, & initio Januarii, 1731, habitas. Motus Primi æquabilis est, quando Secundus in aliquo Ostante residet. Præterlapsis primis istis septem mensibus, propter eandem causam, similique prorsus

prorsus modo, redit Secundus sensim, aliis septem mensibus, per K & k, H & h, usque dum iterum fiat. Primo in umbra constituto vel conjunctus in G, vel oppositus in g, ut ante bis septem menses fuerat. Interea quoque temporis rursus accelerari occcepit Primus, prout Secundum Zyzygiis propiorem nactus est, ita ut tota periodo quatuordecim mensium, seu, ut accuratius definiam, dierum 437, horarum  $3\frac{2}{3}$ , completa, qua duo illi intimi Satellites satis exacte ad eundem inter se & cum Sole atque Jove situm redeunt; inæqualitas quoque motus Primi restituatur in pristinum statum. Notatu omnino dignissimum videtur, quod ista inæqualitas motus Primi Sat. exacte restituatur eadem periodo, qua Satellites ad eundem restituuntur inter se situm, & quod Primus semper acceleratus sit in Zyzygiis cum Secundo, ast retardatus in quadraturis. Anne hoc apertissime prodit, Secundum sua actione & gravitatione perturbare motum Primi? & quid plura? Illustris NEWTONUS, in propositione LXVI: a Libri primi *Principiorum Philosophiæ Naturalis Mathematicorum*, demonstravit, quod *si duo corpora minora circa tertium maximum revolvantur, quorum vires decrescunt in duplicata ratione distantiarum, quæque se mutuo trahunt, & attractiones acceleratrices binorum quorumcunque in tertium sint inter se reciproce ut quadrata distantiarum*; inter alia consuetaria, etiam ita temperatos esse debere corporum illorum minorum motus, ut, ex Corollario III: o, *intimius, seu quod in minori incedit circulo, velocius, ceteris paribus, moveatur in conjunctionibus & oppositionibus cum superiori, quam in quadraturis.* Luna nostra, cujus incessus velocior est in Zyzygiis cum Sole quam in quadraturis, hoc NEWTONI theorema antea confirmavit. Primus  
Jovis.

Jovis Satelles jam novum illi addit robur, & universalitatem legum a NEWTONO sagacissime evolutarum statuminat. Et simul caussa Physica inæqualitatis illius, quam intimus Circum-Jovialis, intra quatuordecim menses se restituentem, emetitur, nulli hætenus comperta, tandem innotuit, quæ exoptatissimam mihi ansam præbuit corrigendi epochas & motus medios numeri C, quos non tam accurate assequi potui, dum eos empirice tantum, ignoratis veris rationibus, tractare necessum habui.

Redeamus ad Secundum, cujus motus excutere nostri est instituti. Rationem quoque reddere oportet novæ inæqualitatis, cui & illius motus est obnoxius. Jam antea indicavi, Secundum, in Jovis umbra cum Primo Satellite conjunctum, semper esse, ceteris immutatis manentibus, maxime retardatum, quod omnes observationes, in hujusmodi Satellitum configurationibus habitæ, uno quasi ore reapse fieri conclamant. Iterum itaque ponamus eos aliquo temporis momento conjunctos in A & G, & mox dimittamus, ut quisque suum, pro more, emetiat stadium. Quum motus Secundi plus duplo tardior sit quam Primi, ita ut quo tempore Secundus semel, eodem Primus non tantum bis peragravit orbem, sed & insuper tres gradus; fit, ut redeunte Secundo ad G, Primus jamjam bis præterierit A, & fere tres gradus sit promotior versus B. Iterum revolvatur Secundus ad G, Primus tum sex gradus erit a Conjunctioe A separatus: & sic porro, pro qualibet Secundi revolutione, Primus fere tres gradus magis magisque recedit a conjunctioe A, per B, C, D, E & F successive. Tandem, cum Secundus, Septem circiter mensium spatio, revolutiones ad umbram 61, emensus est; Primus interea 122 integras periodos atque insuper 180 gra-



gradus seu dimidiam periodum perambulavit, ideoque commorante Secundo in umbra ad G, versatur I:s in oppositione ad *a*. Iisdem his septem mensibus, pro aucta distantia I:i ab A, celeritas quoque Secundi, ad G eclipsin patientis, continuo intenditur, fitque demum illius motus celerrimus, I:o in oppositione ad *a* constituto, cum eorum ad invicem distantia tanta est, quanta maxima fieri potest. Deinde aliis septem mensibus, per *b*, *c*, *d*, *e*, *f*, redit paulatim Primus ad pristinum situm, ita ut diebus 437, horis  $3\frac{2}{3}$ , Secundus 123 & Primus 247 periodos exacte perambulaverit, adeoque ille iterum fit in G eodem tempore quo hic in A. Eodem temporis intervallo inæqualitas motus Secundi etiam restituitur, cuius itaque ea deprehenditur esse natura, ut *retardatus sit in conjunctionibus cum Primio, acceleratus autem in oppositionibus, motusque medius obtineat, commorante I:mo in aliqua quadratura*. Diversitas in celeritate II:i, ex hoc fonte profluens, tanta est, ut Satelles, statis temporibus, gr. 2, m. 24 promotior sit, quam ex motu medio debuerat. Quin causa hujus inæqualitatis in actionibus I:i in II:um sit quærenda, nemini dubium videri poterit, qui illius indolem attente consideraverit. Nec minus certum putaverim, eam legibus motuum notis, de quarum universalitate tot argumentis sumus convicti, congruere, licet nondum ullus Mathematicorum ex iisdem legibus enucleatius docuerit, qualis illa inæqualitas esse debeat.

NEWTONUS, GREGORIUS aliique dilucide exposuerunt, quos errores in systemate trium corporum, quorum duo minora, in circulis inæqualibus, at in eodem plano jacentibus, circa tertium maximum revolvuntur, & in quo attractiones duorum quorumvis in tertium sunt reciproce ut quadrata di-

stantiarum ab eodem; quos, inquam, errores in motibus mediis inferioris producat gravitatio superioris inter duo illa minora, quidque impediatur, quo minus inferius illud, radio ad centrum maximi ducto, describat areas temporibus exacte proportionales: demonstrarunt nempe, ut supra dictum, inferius in Zygyis cum superiori velocius incedere quam in quadraturis. Quos autem errores dictorum corporum superius committat ob attractiones inferioris, neque NEWTONUS, nec alius quispiam adhuc, quantum quidem mihi innotuit, distincte evoluit. Theoriae imprimis nostrae Lunae excolendae operam suam dicavit NEWTONUS, quae quidem sola Tellurem comitatur, sed Sol alterius superioris Satellitis vices supplet, qui sua gravitatione motus Lunae turbat. At Lunae vires Solem, ob maximam hujus distantiam & molem, sensibilibus afficere nequeunt: ideoque non sollicitè inquisivit NEWTONUS in effectum, quem vires inferioris in superiorem exerunt. Sunt tamen alii in systemate Planetario casus, ubi vires corporum mutuae utrinque sensibiles edunt effectus. Revolvunt circa Solem sex Planetae primarii, alii aliis superiores: Saturnum quinque, Jovem quatuor ambiunt Satellites. Planetae, si ad Solem referantur, mole sunt exigui, & ab invicem tam valde distiti, ut vix sensibilem unus in alterum vim exercere valeat, sed quisque libere cursum suum prosequatur, ac si solus esset Solis parastates. Duo tamen sunt, in quibus turbatio mutua non est omnino contemnenda: Saturnus & Jupiter, mole longe maximi, a Sole remotissimi, ideoque ab illius influxu minus potenter coerciti, vim quandam utut exiguam in se habent, quam Saturnus, utpote simul minor & superior, potissimum sentit. Esse quandam in motibus Saturni ano-

anomaliam, Jovis attractionibus debitam, evincunt rationes Physicæ, agnoscunt observationes Astronomicæ: qualis autem quantaque illa sit, quove Jovis situ Saturnus sit acceleratus, quo retardatus, adhuc fere latet. Academia Regia Scientiarum Parisiensis, de Saturni Tabulis perficiendis sollicita, Mathematicos, proposito etjam præmio, nuper invitavit ad solvendum hoc Problema nobilissimum. Fuisse quoque, qui ingenii vires in eo periclitarentur, Viros in Mathematicis consumatissimos: eos tamen Academia desideriiis nondum ex omni parte satisfecisse, sed idem Problema eruditis iterum propositum ab Academia esse, pro obtinendo præmio anni 1750; literæ, a Cl. D. DE L'ISLE ad me datæ, certiores nos faciunt. Resultatum illius disquisitionis anxie exspecto. Interea videamus, quid de illa Saturni perturbatione hætenus cognitum fuerit. NEWTONI aliorumque ratiocinationes eo tendere videntur, ut nobis persuadeant, Saturnum in conjunctionibus cum Jove retardari, maximamque esse retardationem in ipsa conjunctione, cum Planetæ sibi sunt proximi: pro aucta eorum distantia, diminui Saturni retardationem, hancque minimam esse, cum, quantum maxime possunt, a se distant, hoc est, cum Jupiter Saturno opponitur. Rem ita revera esse comparatam, suo exemplo comprobat Secundus Jovis Satelles. In illo inferioris Primi attractiones majores procreare debent errores, ob eorum propinquitatem & æqualem fere magnitudinem, quam attractiones Jovis in Saturno. Id etjam experientia testatur. Vidimus enim Secundum maxime retardari in conjunctionibus cum I:o, minime autem retardari, id est, accelerari in oppositionibus, simili prorsus modo, quo Saturnum in conjunctionibus cum Jove tardius,

in oppositionibus velocius liberiusque incedere, inter Astronomos fere convenit. Lucem igitur suæ invicem theoriæ afferunt Saturnus atque Secundus circum-Jovialis. Et quemadmodum æquatio C Satellitis non maxima est in conjunctione Ii, ubi illius retardatio est maxima, nec minima in oppositione, ubi retardatio Ii est minima, sed æquationis maximum & minimum, pro solenni Æquationum Astronomicarum more, idem etiam exigentibus Observationibus Secundi, incidat in situm Ii ad II:m quadratum; sic & error, quem in motibus mediis Saturni progenerat gravitatio Jovis, non maximus in conjunctionibus & oppositionibus Jovis cum Saturno heliocentricis, ubi causæ errorum sunt maximæ; sed in eorundem quadraturis, sit, necesse est, ubi Saturni motus per se est, ceteris paribus, æquabilis. Adeoque in ipsis conjunctionibus magnis, attractio Jovis non impedit, quo minus motus Saturni cum Tabulis, dummodo illæ probæ sint, consentiant, nec in oppositionibus: sed quoties longitudo heliocentrica Jovis, longitudinem heliocentricam Saturni nonaginta gradibus superat, tum demum retardatio Saturni optime fiet sensibilis, ita ut ejus longitudo vera minor sit quam media, utut æquatione centrica correctâ: contra, longitudinum heliocentricarum differentia existente 270 graduum, longitudo vera Saturni aliquanto esse debet major quam media; posito nempe, quod attractio Jovis in Saturnum, sensibilem producat in hujus motibus turbationem, & quod illa turbatio ejusdem sit indolis, cum turbatione Secundi Satellitis, ab actionibus Ii derivata: quam utramque hypothesin maxime probabilem judico. Immo magis quam probabilem dicerem, nisi Tertius Jovis Satelles judicium aliquantisper suspendere juberet.

Est

Est videlicet II:s, in systemate Joviali, superior respectu I:i, sed simul inferior respectu Tertii, & redit Tertius ad eundem situm cum II:o eadem prorsus periodo, qua I:us & II:s redeunt ad se, nempe diebus 437, horis  $3\frac{2}{3}$ . Sed a sapientissimo universi conditore ita dispositi sunt isti tres Satellites, ut quoties I:us & II:s a Jove visi sunt conjuncti ad A & G, Tertius necessario & semper sit circiter quadrantem sui orbis ab utroque remotus juxta R vel r. Hinc fit, ut nunquam omnes tres simul possint umbra Jovis tegi, sed si II:s & III:s sint conjuncti in umbra apud G & O; Primus tum non procul absit ab oppositione a; Si I:s & III:s in umbra simul occultentur ad A & O, II:s versetur in oppositione ad g. Ponamus jam II:m & III:m conjunctos in umbra, ad G & O; ex positio in superioribus principiis Secundus tum ut inferior est acceleratus: at per hypothesein Primus, eodem temporis articulo, est in oppositione ad a; ergo II:s etiam ut superior debet esse velocior, namque vidimus antea, superiorem esse acceleratum in situ inferioris opposito. Peragat II:us unam revolutionem ad G: interea III:s fere dimidiam absolvit, adeoque est oppositus II:do, qui per consequens iterum ut inferior est acceleratus: at eodem tempore I:s bis orbitam est emensus, atque iterum non procul ab a degit, adeoque & ipse II:o est oppositus, & per consequens II:s etiam adhuc ut superior est acceleratus. Sed quoniam Tertius non unam periodum in orbita integram percurrit, dum II:s duas, fit ut Tertius migret paulatim ab oppositionibus & conjunctionibus cum Secundo, eundem prorsus in modum, quo Secundum ab oppositionibus & conjunctionibus cum Primo se subtrahere solere antea monstravi, & tandem post septem menses, rediens II:s ad G, III:um non in

Zyzygiis, sed in altera quadratura, seu 90 gradus a se elongatum videt: Ideoque II:s tum, utpote inferior, lentissimo incedit gressu. At Primus etiam his septem mensibus sensim situm mutavit, iisque ad finem vergentibus, non amplius est in *a*, II:o oppositus, sed in *A*, conjunctus, unde sequitur II:m eodem etiam tempore ut superiorem esse tardiolem. Aliis septem mensibus tam III:s quam I:s pristinum recuperare situm, immutatis motuum suorum legibus coguntur, & post 123 revolutiones occupante rursus II:o locum *G*, III:s ad conjunctionem in *O*, I:s oppositionem in *a* reversus est. Has vicissitudines semper & continue tres illi Satellites subeunt, & propter summam mirandamque plane commensurabilitatem temporum periodicorum, vix millenis seculis alium contrahere habitum potest mundus Jovialis. Patet hinc, æquationem illam *C* Secundi Satellitis, Tabula XIV:a propositam, non totam deberi actionibus I:i in II:m, sed ejus aliquam particulam causari ab actionibus III:i, qui semper vires suas cum viribus Primi conjungit ad accelerandum vel retardandum Secundum. Difficile sane determinatu erit, quantum ex ista II:i turbatione oriatur ex attractione III:i, quantumque ex I:i, cum semper unitis agent viribus, & ne annorum quidem myriadibus in discordiam redigi queant. Possent tota illa turbatio tribui soli Tertio, idque salva manente theoria. Sed est mihi in promptu argumentum, quo probari posse puto, Primum non minimam culpæ partem trahere. Si Secundus gravitat in I:m, eximiamque in hujus motus medios inducit inæqualitatem, & actioni semper æqualis respondet reactio; necesse est ut I:s vicissim II:i motus turbet, præcipue cum Secundus & superior sit, adeoque minori vi in orbita retineatur, & minor, saltem non major Primo.

At

At alia in motibus Secundi non observatur inæqualitas, quatuordecim restituta mensibus, quam illa sæpius nominata: ergo illa vel ejus pars ab attractione Primi profuit. Huic argumento aliud accedit, non minus validum. In motibus Tertii Satellitis deprehenditur inæqualitas quædam, quæ indicat eum esse retardatum in conjunctionibus, sed acceleratum in oppositionibus Secundi. De hac inæqualitate alia occasione, cum prodierint Observationes Tertii, differendi locus erit. Interim argumentor: si Secundi actio turbat motus Tertii, quare non turbaret Ius Secundum? Turbatio sane Tertii non oritur neque a Quarto, neque a Primo, quod ejus indoles satis declarat: Ergo a Secundo est deducenda. Est etjam hæc inæqualitas Tertii similis inæqualitati supra descriptæ Secundi: ideoque similem agnoscere causam probabile videtur; at illa ab attractione Satellitis inferioris derivatur, ergo & hæc. Iisdem fere argumentis probari potest, Tertium cum Primo concurrere, in producenda illa magna inæqualitate in motibus mediis Secundi Satellitis: adeoque æquationem Tabulæ XIV:æ ex duabus diversis at similibus æquationibus esse conflam, cujus utriusque veram quantitatem si discernere liceret, Satellitum moles inter se comparare, aliaque ad eorum theoriam spectantia eruere non foret difficile. Interim detectæ istarum inæqualitatum causæ, occasionem mihi suppeditarunt optatam, corrigendi Epochas motusque medios Numeri C, Secundi Satellitis, cujus hunc esse usum jam patet, ut argumenti loco sit ad indicandam Primi Satellitis a Secundo elongationem, e Jove visam, cum Secundus Eclipsin patitur: ita quidem, ut 250 arguat Ium esse conjunctum, 750 autem eum esse oppositum Secundo.

Ut

Ut pateſcat commenturabilitas illa temporum periodicorum, cujus nuper mentionem feci; periodos, quibus tres inferiores Sat. ad eundem quam proxime ſitum reſtituuntur, quas Saros compellabo, ob ſimilitudinem cum vetuſto illo Saro Lunari, afferre, a propoſito non alienum duxi. Quartum, quippe qui his periodis non continetur, omiſi. Poſitis menſibus Synodicis, quales meæ Tabulæ ſupponunt:

	D.	h.	I	II	III	IV
I:i	1:	18:	28:	35:	56:	58.
II:i	3:	13:	17:	53:	45:	7.
III:ii	7:	3:	59:	35:	55:	23.

			h.	I	II	III
abſolvit I:s	revolutiones	247	integras,	Diebus	437:	3: 43: 59: 31.
II:s	- - -	123	- - -	- - -	437:	3: 41: 11: 29.
III:s	- - -	61	- - -	- - -	437:	3: 35: 31: 18.

Hic eſt Sarus ille minor, cujus ambitu contineri inæqualitates trium iſtorum Sat., a mutuis gravitationibus oriundas, in præcedentibus fuſius monſtravi. Obſervandum tamen, quod licet I:s cum II:do & II:s cum III:o non reſtituatur, niſi in orbem redeunte Saro; I:s tamen cum III:o, ter intra quemlibet Sarum, in umbra Jovis conjunctus eſſe poſſit. Hæc commenſurabilitas revolutionum facit, ut Tertius, qui hoc tempore eſt circa alteram quadraturam, duobus inferioribus conjunctis, nunquam illum morem mutet. At cum perpenderem, Satellites tamen non exacte, Saro excurrente, reſtitui, ſed eſſe aliquam licet parvam diſcrepantiam; ſperavi fore, ut tandem, lapſu ſeculorum luxatum ſyſtema Joviale, aliam indueret faciem, & fieri aliquando poſſet, ut omnes tres ſimul umbram ſubirent, vel ſaltem III:s a quadratura divelleretur, duobus inferioribus conjunctis. Id ut quantocius accideret, eam ob cauſſam optavi, ne I:s & III:s ſemper, uti jam fit, conjunctis viribus in Secundum a-

gant,



gant, sed mutato situ, contrarios olim edant effectus, ut eo facilius, quantum quisque eorum ad turbandum II:um contribuat, apparere possit. Sed frustra, productis Epochis, tentavi, per multa annorum millia. Rationem mox deprehendi, nempe quod quantum citius II:s absolvit revolutiones 123, quam Primus 247, tantundem citius III:s, pro ratione sui temporis periodici, absolvit menses 61, quam II:s 123. Sunt enim 2: 48, differentia inter Sarum I:i & II:i, ad 5: 40, differentiam inter Sarum II:i & III:i; ut tempus Periodicum Secundi ad tempus periodicum Tertii, quam proxime. Adeoque eodem profus tempore, quo accumulata sensim ista 2: 48 totam Secundi orbitam pervagata sunt; etiam 5:40 integram III:i periodum compleverunt. Requiritur, ad hanc alteram restitutionem, Sari minores 1820, quibus præterlapsis adhuc eadem est constitutio, idem ordo in systemate Joviali. Namque

	D.	h.	'	"	'''
I:s menses Synodicos	449538	absolvit diebus	795619:	13:	28: 8: 26
II:s - - - - -	223860	- - - - -	795619:	13:	32: 19: 40
III:s - - - - -	111021	- - - - -	795619:	13:	29: 1: 55

Hic Sarus major dici potest, & excurrit annis Julianis 2069, quibus arctius copulantur Satellites, quam Saro minore. Mutatio, annis bis mille Systemati inducta, tam parva est, ut millenis seculis parum efficiat. Secundus a reliquis maxime recedit, excessus tamen ille annis demum 1317900 tantum efficeret, ut omnes tres Sat. inferiores simul conjuncti videri a Jove possent, dum modo compages mundi tam diu duraret. Quin & sex minorum tertiorum correctio per annum, in motibus mediis Secundi præstaret, ut omnes intra minutum convenirent in Saro majori. Sed

F contra

contra si quis esset levissimus error in motibus mediis a me supputatis, esse autem præprimis in Tertio, facile potest; citius luxari Jovialium consvera configuratio posset. Cum autem persuasus sim, in nullo Satellite majorem quam unius vel alterius secundi quotannis errorem esse, longam tamen stupendamque annorum seriem postularet ille error, antequam Tertium a quadraturis ad Zyzygias cum I:o & II:o simul perducere valeret. Anne Sapientia Divina vestigia in hisce cernimus, quæ forsân prospicere voluit usibus incolarum Jovialium, & cavere, ne omnibus tribus Lunis facile essent orbatî? Nulla sane apud Jovem illunis nox existit, quo minus ejus saltem aliquam partem Lunularum quæpiam illustret, etjam si Quartus non existeret.

Hæc de attractionibus Satellitum mutuis dicta sufficiant. Si suppeteret numerus eximius bonarum observationum, in aliis configurationibus Satellitum, exempli gratia in conjunctionibus cum Jove inferioribus habitarem, plura fortassis & certiora de turbationibus istis, earumque causis dici potuissent. Opto itaque, nolint Astronomi, qui maximis instructi sunt Telescopiis, negligere occultationes Satellitum supra vel infra Jovem Geocentricas, itemque umbrarum Satellitum per discum Jovis transitus, eorumque conjunctiones mutuas. Planetarum istorum motus melius cogniti, in Geographiæ & Navigationis insigne emolumentum, atque Physicæ Cælestis pars non ignobilis illustrata, operæ & vigiliarum erunt pretium.

Redeamus jam ad Secundum Sat., cujus orbitæ ad orbitam Jovis situs, planorum nempe inclinatio, inclinationisque mutationes, Nodi nodorumque motus sunt investigandi. Hoc non alia methodo facilius cer-

certiusque præstiteris, quam examinando moras Satellitis in umbra Jovis. Si enim illæ semper essent æquales, indicarent, Satellitem in omnibus oppositionibus per centrum umbræ transire, ideoque ipsius orbitam in ipso plano orbis Jovialis jacere. Si moræ non semper sunt æquales; iis temporibus, cum maximæ sunt, Jovem versari circa alterutrum nodum orbitæ Satellitis, arguunt. Si Jupiter non semper in iisdem suæ orbitæ locis observatur, cum moræ sunt maximæ; nodos orbitæ Satellitis moveri patet. Major minorve variatio in durationibus, Eclipsium, majorem minoremve orbitæ Satellitis ad orbitam Jovis inclinationem evincit. Si denique, in æqualibus Jovis a nodis Satellitis elongationibus, moræ Eclipsium variant, variantem quoque esse angulum inclinationis planorum concludere fas est. At rarissime tota duratio eclipsium Secundi immediate observari potest, & non nisi sex ejusmodi observationes, per annos octoaginta obtinere licuit, quod inveniendæ inclinationi orbitæ ipsius non parum obstitit. Nihilominus postquam reliqua Tabularum illius elementa emendata sunt, totam moram Satellitis in umbra indagare possumus, licet plerumque, ante oppositiones Jovis cum Sole, tantum immersiones in umbram, & post oppositionem, emersiones ex umbra unice observare liceat. Si videlicet aliquæ immersiones ante oppositionem Jovis accurate notatæ sint, & post unum alterumve mensem aliquot emersiones, atque ex Tabulis supputentur, omni cum diligentia, tempora earundem Eclipsium: si tam immersiones quam emersiones observatæ æqualiter cum calculo congruunt, vel æqualiter eodemque modo discrepant; illud certo est indicio, Semimoras Eclipsium in Tabulis recte se habere. At si immersiones citius & emersiones tardius

dius visæ sunt, quam calculus jubet, moræ majores sint necesse est, quam quas Tabulæ supponunt: contra, si immerfiones justo tardius & emerfiones citius appareant. Quoniam enim reliqua Tabularum elementa proba supponuntur, & Satellitis motus intra paucos menses nullam subitanæam & improvifam pati perturbationem unquam confvevit, probabile omnino videtur, quod si immerfiones aliam ad Tabulas habeant relationem, quam emerfiones proximæ, Tabulam Semi-morarum in culpa esse. Hoc modo Semimoras examinare non fuit difficile illis temporibus, ubi plures observationes factæ sunt. Sic Semimoræ eclipsium Ili omnium maximæ, unius horæ cum  $26\frac{1}{2}$  minutis, testibus observationibus, inciderunt in ea tempora, cum Jupiter inter 15 & 16 gradum Leonis & Aquarii versatus est, unde prona fuit consequentia, Nodos orbitæ Ili ad illa eclipticæ loca a Jove referri, Nodum nempe ascendentem ad  $15\frac{1}{2}$  gradum Aquarii, descendentem ad  $15\frac{1}{2}$  Leonis. Certe novissimis his annis non longe ab illis locis fuerunt remoti, licet non desint rationes, quæ nodos, ante annos 60, aliquot gradibus fuisse minus elongatos, svadeant. Quod Nodi Tertii Satellitis in consequentia procedant, dubio caret. Nec sane fieri potest, quin nodi Satellitum ex mutuis corporum attractionibus multiplicem sentiant influxum. Quin potius mirari convenit, quod Nodi Satellitum tam sint constantes, ut nullus eorum ultra quinque gradus per octoginta annos processerit, quum tamen orbitæ Lunaris Nodi, velocissimo motu perplexisque suis vacillationibus, Astronomorum vexent ingenia.

CASSINUS & GRAMMATICUS, in suis Tabulis, Semimores maximas Ili tribus fere minutis majores posuerunt, sed omnino refragantibus observatio-

vatio.

vationibus. Evolvamus solummodo eas, quæ anno 1730, quo fere toto Satelles per centrum umbræ transiit, habitæ sunt. Egregiæ illæ sunt & non immerisiones minus quam emersiones calculo congruunt, quod neutiquam fieri potuisset, nisi Semi-moræ in Tabulis recte fuissent constitutæ. Sic & pulcherrimæ illæ, anno jam excurrente 1748, circa Nodum Satellitis Ascendentem, institutæ, magno consensu confirmant Semimoras maximas a me assumptas: Si enim hæ justo minores essent, Immerisiones integra sex minuta calculum anticipassent, emersionibus huic consentientibus: cujus tam subitanæ mutationis nulla allegari potuisset causa.

Quod ad Semi-moras earum eclipsium attinet, quæ fiunt, II:o extra nodos constituto, Astronomi Parisienses jam diu perspexerunt, eas non in æqualibus Satellitis a Nodis distantiis semper fuisse æquales, adeoque planum orbitæ Satellitis non semper eandem servare, ad planum orbitæ Primarii, inclinationem. Intra quos autem cancellos contineatur ista variatio, quibusque periodis restituatur, nullus adhuc definire suscepit. Mihi, totam observationum seriem ad correctiorum Tabularum normam exigenti, non obscure patuit, inclinationem orbitæ II:i, statas satisque regulares servare crescendi & decrescendi vices. Quod antequam ostendere incipiam, methodum illam facillimam tradere oportet, qua usus sum in indagandis istis inclinationibus, tam pro II:o, quam pro reliquis Satellitibus. Quoties moram Satellitis in umbra, vel per immediatam observationem vel per methodum superius descriptam obtinui, latitudinem Jovi-centricam Satellitis, in medio umbræ constituti, a centro umbræ quæsi, idque hoc modo:

Vide fig. II:am. Denotet circellus, *abcd*, sectionem umbræ Jovialis, ad ipsius axin normalem, in ea, quæ est Satellitis, a Jove distantia. Sit *e* centrum umbræ, & *aec* particula quædam eclipticæ Jovialis; *fg* particula orbis satellitis, ad orbitam Jovis inclinati & cum ea convenientis in N. Demissa, ex centro *e* in viam Satellitis, perpendiculari, *ei*; junctisque *ef*; triangulum obtinui *eif*, cujus duo latera *ef* & *fi* sunt nota; illud videlicet est semidiameter umbræ, quem Semi-mora Satellitis maxima, in gradus & minuta orbitæ Satellitis conversa, indicat: hoc autem semimora Eclipteos dato tempore observatæ, itidem in gradus conversa prodit. Angulus *eif* est rectus, unde levi negotio deducitur latus *ei*, hoc est latitudo Satellitis e Jove visa. Deinde ex Tabulis Jovialibus eruo elongationem Jovis a proximo Satellitis nodo, pro dato tempore, e Sole visam, & infero: ut sinus ejusdem elongationis, ad Sinum 90 graduum; ita tangens latitudinis inventæ *ei*, ad tangentem anguli inclinationis orbitæ Satellitis, ad planum orbitæ Jovis, pro dato tempore, veram. Quo magis Jupiter a Nodis Satellitis fuerit remotus, eo certior est hæc calculandæ inclinationis ratio, adeoque certissima, cum 90 gradus utrinque ab illis distat: tum enim minima inclinationis variatio, maxime sensibilem in moras Statellitum habet influxum. Sic ex observatione illa elegantissima, Anni 1668, deduxi inclinationem orbitæ Secundi 2 gr. 33 min. Observatio anni 1680, inclinationem orbitæ dat 3 gr. 22 min. Anno 1685, observata postulant inclinationem, 3 gr. 43 m. Observationes, mense Septembri & Decembri, Anno 1691, institutæ, inclinationem non admittunt, 3 gr. 35 m. majorem. Me quidem non fugit, Astronomum illum excellentissimum,

MARALDUM, in *Commentariis Academia Regie Scientiarum Parisiensis, ad Annum 1729*, ex observata mora transitus Secundi Satellitis per discum Jovis, nocte, Dies 19 & 20 Augusti, Anni 1691, intercedente, deduxisse inclinationem orbitæ hujus Satellitis multo majorem, nempe 4 gr. 33 m. At illa occultationum inferiorum & superiorum Phænomena non tantam in deducendis inde Satellitum motibus pariunt certitudinem, quantam Eclipses in umbra. Cum enim sub disco Jovis se abscondere incipit Satelles, sæpe totis decem minutis in margine Jovis quasi hæret: quod etiam fit in egressu; unde non ita pronum est determinare temporis momentum, quo centrum Satellitis intrat & excedit. Eclipses autem in umbra, fere in instanti initium finemque nanciscuntur, nec observatorem diu tenent suspensum. Et quod observationem a MARALDO citatam concernit, occultari incipiebat Satelles hora 13, min. 21, & hora demum 13, m. 32 totus delitescerebat. hora 15, m. 34, prominere coepit emerfurus, & tandem h. 15, m. 45 totus evasit. Hinc moram centri Satellitis sub disco concludit duarum horarum & 13 minutorum; Sed quam incerta hæc fit, quivis videre potest. Major adhuc incertitudo in observata occultatione II:i superiore, die 30 Januarii, Anno 1695, irreperit necesse est. Moram enim hujus justo longiorem, quemadmodum prioris justo breviorum assumfisse CI MARALDUM, non uno argumento evincere possem, si vacaret. Ex conjunctis igitur binis istis observationibus non potuit non erui inclinatio orbitæ justo major. Certe tanta inclinatio cum observatis Eclipsibus II:i nullo modo conciliari potest. Porro inclinatio illa, Annis 1697 & 1702, fuisse videtur 2 gr. 57 m. circiter. Anno 1715, ex accuratissimis

mis illis Parisiensium Astronomorum observationibus, inclinatio provenit 3 gr. 52 min. Anno 1721, 3 gr. 24 min. Anno 1727, 2 gr. 59 minutorum: Anno 1733, inclinatio 2 gr. 45 minutis vix major obtinuit. Tandem observationes Anni 1747, inclinationem orbitæ II: Satellitis tum 3 gr. 26 min. fuisse arguunt. In his calculis Satellitem nobis exstingvi supposui, ipsius centro superficiem umbræ attingente, nec emergentem nobis conspicuum fieri, antequam dimidius tenebris excessit. Nodorum quoque loca fixa posita; quæ utraque hypothesis fortassis fallere potest. Præterea minus certa scrupulosioribus videri poterit illa a me subinde usitata, ex sparsis observationibus moras eliciendi, ratio. Fateor quod hæc singula aliquid facere possint, sed ne conjuncta quidem tantum, ut ipsius inclinationis, auctæ & diminutæ vicissim, vel fidem infringant, vel modum dubium reddant. Namque ut ad primam objectionem, quæ minimi est momenti, nihil respondeam; incertitudo Nodorum non ultra tres vel quatuor gradus se extendit, quibus eos jam magis promotos suspicor, quam priori seculo fuerunt: at quoniam observationes, quibus in hac inductione usus sum, habitæ sunt, Satellite non longe a limitibus constituto; tam paucorum graduum, si qui fuerit, de vero Nodi loco error, parum sensibilem in conclusione inclinationis produceret hallucinationem. Nec denique in moris magna aberratio est extimescenda, præterquam enim quod earum multas immediate observatas habeam, persuasissimus sum, supra nominatam moras eruendi methodum non multum fallere posse, præcipue illis annis, quibus plurimæ & immerfiones & emerfiones sunt notatæ. Ergo certum manet, inclinationem orbitæ II: Satellitis, Anno 1668 fuisse minimam,

&



& crevisse ad Annum 1685. Deinde iterum diminutam, usque ad 1700, & postea rursus auctam ad Annum 1715; Porro diminutam ad Annum 1733, & deinde iterum auctam fuisse ad Annum 1740. Omnium maxima inclinatio 3 gr. 52 min., obtinuit Anno 1715; & quoniam Annis 1685 & 1691 parum minor fuerit, probabile videtur, eam anno quodam intermedio; nempe 1687, æqualem fuisse inclinationi Anni 1715, adeoque annis 28 restitutam in eundem situm. Minimæ inclinationes locum habuerunt, Annis 1668, 1700, & 1733. Sed hoc postremo anno jam cœperat augeri, ita ut minima fuisse videatur, anno 1731. Ex his omnibus satis in aprico est, orbitam II:i triginta circiter annorum periodo restitui in eundem situm. Longior observationum series istius variationis leges penitus pandet. De causâ hujus variationis Physica ne probabilem quidem conjecturam afferre valeo, sed eam indagandam oculatioribus relinquo. Licet autem de inclinationis variationibus & quantitate nullum mihi dubium remaneat, Tabula tamen XV:a non dum est vitii expers, quod vel solæ testantur observationes circa finem Anni 1740 & initium Anni 1741 institutæ, quarum a calculo dissensum correctior alia Tabula fere totum tollet. Nunc nihil aliud superest, quam ut observationum, quam pollicitus sum, seriem tradam.

G

Obfer-

# Observationes Eclipsium Secundi Planetæ Circum - Jovialis, In umbra sui Primarii, Cum Tabulis Collatæ.

An.	Menf.	D.	h.	"	"	Error Calculi	Ph.	Locus.	An.	Menf.	D.	h.	"	"	Error Calculi	Ph.	Locus.	
1668	Jan.	1	8	8	0	1 48	+	Jm.	Bonon.	1689	Oct.	4	8	7 46	2 9	+	E.	Gren.
1669	Jan.	1	10	46	0	1 38	+	Em.	Bonon.	1691	Jan.	2	6	46 28	2 57	+	E.	Gren.
1671	Nov.	8	18	25 22	3 23	+	+	J.	Parif.	Feb.	3	6	33 26	3 10	+	E.	Gren.	
1671	Dec.	3	15	20 10	2 0	+	+	J.		Feb.	3	6	42 14	3 32	+	E.	Parif.	
1672	Feb.	12	16	42 38	1 51	+	+	J.		Sept.	29	7	33 42	1 35	+	J.	Parif.	
	Mart.	19	8	29 31	2 5	+	+	E.		Sept.	29	7	23 40	0 43	+	J.	Gren.	
	Mart.	26	11	5 31	2 17	+	+	E.		Dec.	9	11	55 15	1 26	+	E.	Parif.	
1672	Apr.	20	8	10 43	2 0	+	+	E.		Dec.	9	11	47 25	0 6	+	E.	Gren.	
1673	Feb.	5	15	21 55	2 47	+	+	J.		1692	Mart.	7	8	45 50	0 12	+	E.	Gren.
	Feb.	23	9	53 18	1 21	+	+	J.		Sept.	29	9	47 10	0 25	+	J.	Gren.	
	Apr.	28	11	58 55	1 33	+	+	E.		1693	Mart.	8	10	42 2	1 39	+	E.	Gren.
1673	Maj.	30	11	30 53	2 51	+	+	E.		1693	Sept.	30	11	52 29	0 42	+	J.	Gren.
1674	Maj.	24	10	8 0	1 0	+	+	E.		1694	Mart.	2	9	40 28	2 24	+	E.	Gren.
1675	Jun.	26	11	0 16	0 51	+	+	E.		1694	Oct.	8	16	18 14	2 21	+	J.	Parif.
1675	Aug.	22	7	58 39	0 21	+	+	E.		1695	Apr.	29	8	11 0	0 2	+	E.	Parif.
1676	Jul.	28	12	18 3	2 0	+	+	E.			Apr.	29	8	50 52	0 40	+	E.	Rom.
1677	Aug.	16	8	45 34	0 23	+	+	E.		Oct.	9	17	24 6	0 8	+	J.	Gren.	
1677	Sept.	24	11	29 17	0 26	+	+	E.		Oct.	9	17	33 24	0 0	+	J.	Par.	
1679	Jul.	24	13	50 24	2 41	+	+	J.		1695	Oct.	9	17	33 24	0 0	+	J.	Gren.
1680	Sept.	12	10	42 15	4 23	+	+	J.		1696	Jan.	13	15	44 12	0 46	+	J.	Gren.
1680	Sept.	12	13	11 15	4 49	+	+	E.		1696	Mart.	3	12	36 0	0 18	+	E.	Par.
1681	Oct.	15	12	30 0	3 12	+	+	J.		1696	Jul.	2	8	24 0	1 24	+	E.	Par.
1681	Dec.	11	8	43 30	4 11	+	+	J.	Parif.	1697	Mart.	4	11	12 50	0 22	+	J.	Par.
1681	Dec.	11	8	33 15	3 6	+	+	J.	Gren.	Mart.	4	11	1 23	1 55	+	J.	Gren.	
1682	Sept.	21	16	52 28	4 39	+	+	J.	Gren.	Maj.	7	13	5 38	1 16	+	E.	Par.	
1683	Apr.	12	8	59 55	0 41	+	+	E.	Parif.	1697	Maj.	7	12	56 56	1 44	+	E.	Gren.
1683	Nov.	18	14	49 20	3 36	+	+	J.	Gren.	1698	Maj.	8	14	19 50	1 0	+	E.	Par.
1683	Dec.	20	14	9 50	5 0	+	+	J.	Gren.	1699	Maj.	9	12	47 30	1 0	+	J.	Gren.
1683	Dec.	27	16	40 50	4 44	+	+	J.		1700	Aug.	31	11	2 52	2 18	+	E.	Gren.
1684	Jan.	3	19	13 0	3 59	+	+	J.		1700	Oct.	27	8	15 0	1 7	+	E.	Gren.
1685	Febr.	15	11	52 22	4 24	+	+	J.		1701	Jul.	31	10	7 4	0 39	+	J.	Gren.
	Mart.	12	9	1 30	3 5	+	+	J.			Sept.	19	7	47 45	2 8	+	E.	Par.
	Apr.	13	11	11 30	1 33	+	+	E.		Oct.	21	7	39 35	2 9	+	E.	Upm.	
1685	Maj.	8	8	14 38	3 52	+	+	E.			28	10	18 2	2 9	+	E.	Upm.	
1686	Jun.	10	8	57 12	0 28	+	+	E.		Oct.	28	10	25 43	2 28	+	E.	Par.	
											Oct.	28	10	16 28	2 33	+	E.	Gren.
1687	Jun.	18	12	57 2	1 19	+	+	E.			Nov.	22	7	24 35	1 51	+	E.	Gren.
1688	Aug.	7	8	54 22	3 5	+	+	E.			Nov.	22	7	26 18	1 18	+	E.	Upm.
1688	Oct.	3	6	14 56	1 8	+	+	E.		1701	Dec.	24	7	43 20	1 17	+	E.	Bon.
1688	Nov.	4	6	1 27	0 36	+	+	E.		1702	Aug.	1	13	13 40	0 33	+	J.	Bon.
1689	Sept.	2	8	4 12	2 46	+	+	E.	Gren.	1702	Aug.	1	12	38 25	0 12	+	J.	Par.

# Observationes Eclipsium Secundi Satellitis Jovis.

An.	Menf.	D.	h.	"	Error Calculi	Ph.	Locus.	An.	Menf.	D.	h.	"	Error Calculi.	Ph.	Locus.				
1702	Aug.	8	15	51	36	0 6	+	J.	Bon.	1720	Mart.	1	15	25	10	1 36	—	J.	Cofm.
	Aug.	8	15	54	26	1 46	+	J.	Rom.		Apr.	20	12	4	43	1 41	+	E.	
	Oct.	22	10	25	15	3 23	+	E.	Bon.		Maj.	15	9	6	22	0 5	—	E.	
	Oct.	22	9	40	38	3 2	+	E.	Upm.		Maj.	22	11	39	32	0 5	—	E.	
	Oct.	22	10	31	0	2 10	+	E.	Rom.		Jan.	9	6	3	54	1 14	—	E.	
1703	Dec.	25	10	1	24	0 1	+	E.	Rom.	Jun.	16	8	38	2	3	—	E.		
1703	Dec.	1	10	4	54	1 25	+	E.	Mart.	1720	Jul.	18	8	13	7	1 21	—	E.	
1703	Dec.	8	12	41	10	0 25	+	E.	Mart.	1721	Jan.	22	14	33	12	1 21	—	J.	
1703	Dec.	19	8	38	7	1 27	+	E.	Upm.	Jan.	29	17	7	33	1 37	—	J.		
1704	Aug.	20	12	15	34	1 57	—	J.	Upm.	Mart.	13	8	42	28	2 37	—	J.		
1704	Oct.	5	17	11	14	4 18	—	J.	Upm.	Mart.	20	11	18	25	2 6	—	J.		
1704	Oct.	16	9	2	19	3 2	—	J.	Upm.	Apr.	21	13	17	56	0 35	—	E.		
1705	Jan.	20	10	16	10	1 16	—	E.	Upm.	Maj.	23	12	50	32	0 58	—	E.		
	Sept.	29	16	39	26	1 20	—	J.	Mart.	Jun.	27	9	45	35	1 4	—	E.		
	Oct.	6	15	10	41	3 1	—	J.	Upm.	Jul.	12	6	43	31	1 41	—	E.		
	Oct.	31	16	11	49	1 51	—	J.	Upm.	Jul.	19	9	18	28	2 16	—	E.		
1705	Dec.	16	16	27	42	3 10	—	J.	Mart.	1721	Aug.	12	6	25	5	3 0	—	E.	Cofm.
1707	Mart.	20	9	46	16	1 25	—	J.	Upm.	1722	Jan.	16	17	31	3	3 31	—	J.	Rom.
1710	Apr.	5	16	51	32	1 22	—	J.	Par.	Mart.	14	9	50	2	40	—	J.	Cofm.	
1711	Jul.	22	12	1	30	5 12	+	E.	Rom.	Mart.	21	12	27	8	4 49	—	J.		
										Apr.	15	9	37	14	2 40	—	J.		
1712	Jun.	27	13	24	37	2 54	—	J.	Par.	Jun.	4	6	6	19	0 28	—	E.	Cofm.	
1713	Jul.	30	15	7	11	3 34	+	E.	Par.	Jun.	4	10	36	40	1 39	—	E.	Ingol.	
1713	Nov.	7	7	5	40	2 14	—	E.	Græn.	Jul.	6	5	39	7	2 34	—	E.	Cofm.	
1714	Sept.	12	9	34	30	0 24	—	J.	Parif.	Jul.	20	10	49	39	4 0	—	E.	Cofm.	
1714	Nov.	1	6	30	7	3 46	+	E.		1722	Aug.	14	7	55	30	3 25	—	E.	Cofm.
1715	Jul.	11	12	38	8	3 20	—	J.		Mart.	15	15	24	58	2 55	—	J.	Ingol.	
	Jul.	18	15	11	27	2 14	—	J.		Apr.	16	15	14	40	1 30	—	J.		
	Aug.	12	12	15	33	2 55	—	J.		Maj.	18	14	59	6	1 38	—	J.		
	Aug.	12	14	31	5	3 47	—	E.		Jun.	30	9	16	0	1 39	—	E.		
	Aug.	19	14	52	20	3 0	—	J.		Jul.	7	11	49	40	0 19	+	E.	Ingol.	
	Sept.	6	9	25	34	2 26	—	J.		Jul.	14	9	56	56	0 13	—	E.	Cofm.	
	Sept.	6	11	39	54	2 22	—	E.		Aug.	1	8	57	20	0 9	+	E.	Ing.	
	Sept.	20	14	40	55	2 24	—	J.		Aug.	8	7	5	21	0 16	+	E.	Cofm.	
	Oct.	8	9	15	22	2 15	—	J.		Aug.	15	9	43	7	0 11	+	E.	Cofm.	
	Oct.	15	11	52	43	2 2	—	J.		Sept.	9	6	57	7	1 34	—	E.	Cofm.	
1715	Oct.	22	14	30	15	2 41	—	J.	Parif.	Sept.	16	9	35	17	1 49	—	E.	Cofm.	
1716	Dec.	4	8	19	4	0 32	—	E.	Rom.	Sept.	27	6	2	12	3 0	—	E.	Ingol.	
	Jan.	5	8	41	29	2 29	—	E.	Par.	Maj.	11	13	56	40	1 42	—	J.	Ing.	
	Febr.	6	7	52	49	2 21	—	E.		Jun.	12	13	40	20	0 40	—	J.	Rom.	
	Febr.	13	8	11	25	0 26	—	J.		Jun.	19	16	16	53	1 28	—	J.	Rom.	
	Apr.	10	7	52	30	1 25	—	E.		Aug.	26	8	7	30	0 36	—	E.	Ing.	
	Jul.	11	15	5	56	2 53	—	J.		Sept.	2	10	45	0	1 28	+	E.	Ing.	
	Sept.	6	11	48	3	3 23	—	J.		Nov.	9	6	42	40	1 0	+	E.	Pekt.	
1716	Oct.	8	11	24	1	0 43	+	J.	Par.	1724	Jul.	15	15	23	18	0 32	—	J.	Ing.
1720	Febr.	16	10	15	10	2 38	—	J.	Cofm.	1725	Aug.	9	11	51	20	1 48	—	J.	South.

# Observationes Eclipsium Secundi Satellitis Jovis.


An.	Menf.	D. h. ' "	Error Calculi	Ph.	Locus.	An.	Menf.	D. h. ' "	Error Calculi	Ph.	Locus.			
1725	Sept. Oct.	10 15 25 30	0 24	—	E.	Ing.	1727	Oct. Nov.	25 16 5 40	0 39	—	J.	Pek.	
		2 6 26 0	0 1	+	E.	Pek.			19 8 44 13	1 30	—	E.	Bon.	
	5 12 47 20	0 47	—	E.	Ing.	19 15 40 45		2 8	+	E.	Pek.			
	9 9 6 0	0 5	+	E.	Pek.	23 5 2 0		1 14	—	E.	Pek.			
	16 11 45 30	0 10	+	E.	Pek.	Nov. Dec.		30 7 37 42	2 14	—	E.			
Oct.	30 9 16 23	1 20	+	E.	Upm.	7 10 11 13	0 33	—	E.					
1726	Dec.	5 5 59 0	0 18	—	E.	Pek.	1727	Dec.	14 12 47 39	1 52	—	E.	Pek.	
		12 8 31 40	0 48	+	E.	Pek.			28 13 14 44	2 31	—	E.	Petr.	
		26 6 40 30	0 30	—	E.	Ing.			Jan.	1 7 16 16	1 9	—	E.	Pek.
1726	Jan.	26 5 51 12	1 8	+	E.	South.	Jan.	8 9 51 0	0 38	—	E.	Pek.		
		6 5 29 0	1 15	+	E.	Pek.	Febr.	2 7 3 45	0 19	+	E.	Pek.		
1727	Jul.	9 15 16 40	3 4	—	J.	Ing.	1728	Feb.	16 6 40 5	1 8	—	E.	Petr.	
		20 14 8 0	0 25	—	J.	Pek.			Oct.	18 15 34 10	0 12	+	J.	Pek.
		3 12 25 6	2 50	—	J.	Ing.			Oct.	25 18 8 45	0 18	—	J.	
		14 11 23 15	4 3	—	J.	Pek.			Nov.	19 15 3 20	1 29	+	J.	
		21 14 0 0	1 19	—	J.	Pek.			Nov.	26 17 35 55	1 8	+	J.	Pek.
1728	Aug. Sept.	28 9 40 0	0 48	—	J.	Ing.	1729	Dec.	3 14 24 30	0 48	+	J.	Petr.	
		28 8 56 22	1 49	—	J.	Upm.			Dec.	7 9 25 0	0 42	+	J.	Pek.
		8 8 40 0	1 29	—	J.	Pek.			Dec.	28 14 6 3	1 20	—	E.	Petr.
		11 16 13 20	1 15	+	J.	Petrop.			Jan.	26 6 14 18	1 14	—	E.	Pek.
15 11 21 0	1 58	—	J.	Pek.	Jan.	29 12 32 5	0 14	—	E.	Ban.				
1729	Sept. Nov.	22 13 59 40	0 45	—	J.		1730	Feb.	2 8 49 0	2 19	+	E.	Pek.	
		10 11 12 15	1 47	—	E.				9 11 28 45	1 25	+	E.	Pek.	
		4 8 26 10	1 7	—	E.				16 8 26 42	1 13	—	E.	Petr.	
		11 11 2 15	0 26	—	E.	Pek.			23 11 5 55	0 25	—	E.	Petr.	
		25 10 30 31	0 9	—	E.	Petr.			Feb.	27 6 9 0	0 51	+	E.	Pek.
1730	Nov. Dec.	29 5 33 0	0 56	—	E.	Pek.	1730	Mart.	6 8 40 49	0 40	+	E.	Pek.	
		6 8 9 2	1 14	—	E.	Pek.			Mart.	13 11 30 10	0 46	+	E.	Pek.
		20 6 18 54	0 32	—	E.	Bon.			Mart.	27 11 7 25	0 22	+	E.	Petr.
		27 8 54 12	0 14	—	E.	Bon.			Maj.	9 8 49 30	2 46	—	E.	Pek.
		27 10 9 56	0 2	+	E.	Petr.			Nov.	6 11 52 25	1 46	+	J.	Pek.
1726	Dec. Jan.	27 8 19 0	0 50	—	E.	Parif.	1729	Nov. Dec.	27 13 41 6	1 28	+	J.	Petr.	
		7 7 47 30	1 14	+	E.	Pek.			Dec.	15 13 41 30	0 5	+	J.	Pek.
		21 7 17 15	0 16	+	E.	Petr.			Dec.	22 16 10 45	1 5	+	J.	Pek.
		28 8 38 0	1 1	+	E.	Bon.			1729	22 10 27 39	0 1	+	J.	Petr.
		28 13 37 9	1 14	—	J.	Petr.			1730	Jan.	2 7 57 15	0 59	+	J.
1727	Aug.	4 14 21 7	1 39	—	J.	Par.	1730	Jan. Feb.	5 15 29 40	0 15	+	J.	Petr.	
		4 15 0 8	0 10	—	J.	Rom.			Jan.	27 7 47 27	0 17	+	E.	Pek.
		22 10 43 57	1 18	—	J.	Petr.			Feb.	10 12 58 50	0 57	+	E.	Pek.
		29 13 21 35	1 25	—	J.	Petr.			17 15 36 20	0 50	+	E.	Pek.	
		29 11 29 3	0 53	—	J.	Parif.			17 9 52 34	0 26	+	E.	Petr.	
1728	Aug. Sept. Oct.	29 13 59 27	0 39	—	E.		1730	Febr. Mart.	28 7 33 15	1 17	+	E.	Pek.	
		5 14 6 45	1 9	—	J.				Mart.	3 15 8 56	0 43	—	E.	Petr.
		23 8 41 9	0 51	—	J.				7 10 13 36	0 22	—	E.	Pek.	
		14 16 36 21	2 56	—	J.	Parif.			14 12 51 45	0 35	+	E.	Pek.	
		25 9 5 15	0 24	—	J.	Bon.			Mart.	28 12 26 15	1 3	+	E.	Petr.

# Observationes Eclipsium Secundi Satellitis Jovis.

An.	Menf.	D. h. "	" "	Error Calculi	Ph.	Locus.	An.	Menf.	D. h. "	" "	Error Calculi	Ph.	Locus.	
1730	Apr.	1	7 30 48	0 28	+	E. Pek.	1733	Jun.	27	9 51 5	2 19	—	E. Madr.	
	Apr.	22	9 43 11	1 14	+	E. Petr.		1734	Feb.	27	14 56 31	1 16	—	J. Petr.
	Apr.	29	10 19 28	0 35	+	E. South.			Mart.	31	13 30 56	3 11	—	J. Bon.
	Nov.	14	16 5 30	0 56	+	J. Pek.			Maj.	20	9 14 13	0 41	—	E. Madr.
	Nov.	21	18 37 0	0 22	—	J. Pek.			Jun.	21	11 0 25	1 15	—	E. Petr.
Nov.	28	13 19 46	0 14	—	J. South.	Jun.	21	9 48 48	1 8	—	E. Rom.			
1731	Dec.	5	17 50 40	1 13	+	J. Petr.	1734	Jun.	21	9 43 12	0 2	—	E. Bon.	
	Dec.	16	15 21 5	1 14	—	J. Pek.		Jun.	21	9 51 46	0 6	—	E. Berol.	
Dec.	23	17 49 50	0 36	—	J. Rom.	Jun.		28	12 22 38	1 32	—	E. Berol.		
Jan.	3	9 30 45	3 33	+	J. Parif.	Jul.		23	9 27 34	1 55	—	E. Berol.		
1732	Jan.	17	14 37 30	1 11	—	J. Petr.	1736	Jun.	29	14 10 39	0 13	+	J. Petr.	
	Jan.	24	17 9 56	0 58	—	J. Petr.		Aug.	11	8 51 0	0 24	+	E. Petr.	
	Feb.	4	8 59 0	0 18	—	J. Petr.		Aug.	18	11 31 10	0 21	—	E. Berol.	
	Feb.	15	13 49 48	1 16	+	E. Petr.		1737	Jun.	23	13 39 55	0 51	+	J. Petr.
	Mart.	8	11 29 20	0 16	+	E. Petr.		Aug.	19	10 44 18	1 17	+	J. Petr.	
1733	Mart.	29	11 33 8	0 2	+	E. South.	Aug.	19	9 35 36	2 29	+	J. Berol.		
	Apr.	29	7 51 6	0 34	+	E. Cofm.	Sept.	13	9 47 25	2 55	—	E. Berol.		
	Apr.	2	8 38 0	0 54	+	E. Pek.	Oct.	8	7 24 0	1 51	—	E. Upfal.		
	Apr.	9	11 16 0	0 28	+	E. Pek.	Oct.	8	8 14 10	1 31	—	E. Petr.		
	Apr.	23	10 44 47	0 42	+	E. Petr.	1737	Oct.	15	9 37 10	1 5	—	E. Bonon.	
Maj.	25	10 26 52	1 5	—	E. Petr.	Oct.		15	9 45 30	0 55	—	E. Berol.		
Maj.	25	8 35 55	0 2	+	E. Par.	Nov.		2	5 27 37	0 47	—	E. Petr.		
Oct.	14	17 50 30	2 3	+	J. Pek.	Nov.	16	8 48 0	1 18	—	E. Parif.			
Dec.	10	14 17 0	0 34	—	J. Pek.	1738	Jul.	19	13 16 7	0 55	+	J. Petr.		
1734	Dec.	17	16 45 15	1 39	+	J. Petr.	Aug.	13	10 27 49	1 4	+	J. Petr.		
	Dec.	24	13 30 56	1 56	+	J. Petr.	Aug.	20	13 6 51	1 28	+	J. Petr.		
	Jan.	18	16 5 15	0 1	—	J. Pek.	Sept.	7	7 45 20	2 40	+	J. Petr.		
	Jan.	25	18 36 12	1 3	+	J. Petr.	Sept.	14	10 27 11	1 13	+	J. Upfal.		
Febr.	5	10 26 46	0 23	—	J. Petr.	Sept.	14	9 34 54	3 0	+	J. Upfal.			
1735	Feb.	12	13 2 0	1 37	—	J. Petr.	Sept.	21	13 7 7	1 10	+	J. Petr.		
	Mart.	22	10 56 3	0 5	+	E. Bon.	Sept.	28	15 47 5	1 25	+	J. Petr.		
	Mart.	29	13 32 4	0 27	—	E. Bon.	Nov.	10	8 17 25	0 46	—	E. Parif.		
	Apr.	23	10 35 32	0 9	—	E. Bon.	Nov.	10	8 53 52	1 13	—	E. Bon.		
	Apr.	23	6 7 30	0 37	—	E. Cofm.	Dec.	5	6 24 16	0 18	—	E. Upfal.		
1736	Apr.	30	12 23 57	1 6	—	E. South.	1738	Dec.	12	7 57 33	0 29	+	E. Parif.	
	Maj.	11	12 0 5	0 40	+	E. Pek.	1739	Feb.	7	6 38 11	1 27	+	E. Petr.	
	Jun.	5	9 1 18	2 42	—	E. Pek.	Aug.	14	12 59 15	0 58	—	J. Petr.		
	Aug.	4	7 31 20	2 2	—	E. Cofm.	Aug.	21	15 36 10	0 43	—	J. Petr.		
1733	Febr.	1	14 26 30	0 40	+	J. Madr.	1739	Dec.	6	9 12 5	2 25	+	E. Petr.	
1737	Feb.	26	13 46 51	0 7	+	J. Petr.	1740	Jan.	21	12 15 30	0 32	+	E. Parif.	
	Apr.	17	10 32 34	2 3	—	E. Petr.	Feb.	1	6 5 39	0 17	+	E. Petrop.		
	Apr.	24	13 6 0	0 38	—	E. Petr.	Feb.	8	6 51 36	1 23	+	E. Parif.		
	Maj.	19	10 4 16	0 39	—	E. Petr.	Feb.	15	7 4 8	0 31	+	J. Par.		
	Maj.	26	12 39 35	3 16	—	E. Petr.	1740	Febr.	15	9 31 23	1 38	+	E. Par.	

# Observationes Eclipsium Secundi Satellitis Jovis.

An.	Menf.	D. h. "		Error Calculi		Ph.	Locets.	An.	Menf.	D. h. "		Error Calculi		Ph.	Locus.
		'	"	"	"					"	"	"	"		
1740	Feb.	22	9 43 59	0 28	+	J.	Par.	1742	Mart.	13	11 49 22	1 18	+	E.	Petr.
	Oct.	28	12 16 5	2 28	—	J.	Pek.		Apr.	7	9 7 56	1 33	+	E.	Petr.
	Nov.	4	8 14 10	1 34	—	J.	Upsal.		Apr.	14	10 56 40	1 20	+	E.	Upsal.
		4	14 49 24	2 9	—	J.	Pek.		Oct.	19	17 19 17	2 52	+	J.	Upsal.
		11	17 21 48	1 26	—	J.			Oct.	19	18 9 52	2 47	+	J.	Petr.
22	9 10 57	1 50	—	J.		Dec.	22	16 21 7	2 17	+	J.	Torn.			
1740	Nov.	29	11 42 32	1 1	—	J.		1743	Jan.	9	10 11 28	1 34	+	J.	Ups.
	Dec.	6	14 15 20	1 30	—	J.	Jan.		16	12 43 21	1 1	+	J.	Ups.	
	Dec.	31	13 51 22	0 54	+	E.	Jan.		16	13 34 15	0 37	+	J.	Petr.	
1741	Jan.	7	16 26 15	0 31	+	E.	Feb.		28	7 46 30	0 55	+	E.	Petr.	
		11	5 41 51	3 9	+	E.	Pek.	Mart.	7	9 32 31	0 20	+	E.	Ups.	
		14	13 16 6	2 51	+	E.	Petr.	1743	Mart.	7	9 59 12	0 21	—	E.	Torn.
		18	8 18 16	3 6	+	E.	Pek.		Apr.	1	7 32 22	0 7	+	E.	Petr.
	Jan.	25	10 53 20	5 9	+	E.	Pek.		Apr.	8	9 45 7	0 22	+	E.	Torn.
	Febr.	1	13 32 0	4 38	+	E.	Pek.		Maj.	17	11 40 3	0 5	—	E.	Ups.
	Feb.	8	10 30 20	0 41	+	E.	Petr.		1744	Mart.	7	9 3 22	1 38	+	J.
	Febr.	8	8 35 39	3 32	+	E.	Parif.	1744	Apr.	8	11 13 48	0 28	—	E.	Petr.
	Mart.	19	13 11 45	0 22	+	E.	Petr.		Apr.	15	13 50 41	2 24	—	E.	Petr.
	Mart.	19	12 20 44	0 53	+	E.	Upsal.		Maj.	10	10 49 27	0 59	—	E.	Petr.
	Mart.	23	8 14 0	2 52	+	E.	Pek.		Febr.	18	15 58 8	3 7	+	J.	Petr.
	Apr.	13	10 30 14	2 31	+	E.	Petrop.		1746	Apr.	17	13 15 2	1 57	—	J.
1741	Oct.	4	17 8 49	0 35	—	J.	Pek.	1748	Jun.	14	12 55 31	3 14	+	J.	Ups.
	Nov.	12	12 33 0	2 17	—	J.	Upsal.		Jun.	14	11 54 0	3 15	+	J.	Parif.
1742	Dec.	28	17 42 26	0 27	—	J.	Petr.		Jun.	21	14 33 31	2 42	+	J.	Parif.
1742	Jan.	8	9 29 57	0 29	—	J.	Petr.		Sept.	29	7 20 39	3 9	+	E.	Ups.
1742	Feb.	9	11 57 16	1 15	+	E.	Petr.		Oct.	6	9 58 43	3 2	+	E.	Ups.
1742	Feb.	16	14 34 0	1 44	+	E.	Petr.	Oct.	6	10 1 28	2 47	+	E.	Holm.	



# RUNOGRAPHIA GOTHLANDICA.

AUCTORE  
GEORGIO WALLIN.



Ordo, quem antea inuimus, in Cippis nostris Runicis observandus, ut melius innotescat, *Catalogum* præmittimus omnium Parœciarum *Septentrionalis* primum Gothlandiæ, deinde *Meridionalis*. Optarim, ut tam correcte nomina exprimantur typis, atque heic fideliter sunt exarata. Enumerantur quidem HADORPH, STRELOW, WOLFF, SCHOUMACHER, alii; sed non eo ordine, nonnunquam etiam, præcipue apud primum, vitiose sunt excusa, ut pauca agnoscamus pro nostris. Videbimus aliquando V. D. utilitatem, nam plurimum ab ipsis Locorum nominibus exoriri lucis in re Historica, nemini eruditorum ignotum est. Et, sicubi terrarum, id omnino de nobilissima vetustissimaque Gothorum Insula ac Sede certissimum.

Literæ majusculæ Ecclesias designant *primarias*, five matrum instar hodierna ætate consideratas, ideoque Svethice dictas *Moder-Kyrkor*. Olim enim primis Christianismi temporibus ac sub Papatu, omnes fere erant jure honoreque pares, & singulæ suos habebant plerumque Curatos ac clericos, ceu adhuc domiciliorum testantur reliquiæ. Minoribus signatæ literis sunt illæ, quas more vulgari vocamus *filiales* vel *Anexas*.

Mira-

Mirabuntur, non dubito, multi, qui felices fo-  
lent bis, ter & pluries centena prædia in quavis majo-  
ri ecclesia numerare, velle nos vocare nostras prin-  
cipes non paucas, cum audiverint maximam apud  
Gothlandos, nimirum *Ledebröensem*, ne triginta qui-  
dem prædia (*Hemmantal*) integra complecti. Sed  
mira cumulabimus miris, dum dicimus paucissima  
dari in continenti templa, Gothlandicis æqualia mo-  
le, splendore ac magnificentia. Immo, quod omnem  
prope fidem superat, interdum ecclesiola 3. 5. vel 6.  
colonorum suam habet ædem sublimem, nitidam,  
ornatissimam, fartam quoque tectam conservat tue-  
turque sola, nulla unquam implorata transmarina a-  
liorum ope. Hæ paucæ manus sufficiunt desiderio,  
& damna refarciunt. Sin magna urget necessitas,  
mutuus vicinorum amor, ex pacto, succurrit.

## GOTHLANDIÆ

### PARS SEPTENTRIONALIS

Sequentes continet Paroecias.

- |             |                |
|-------------|----------------|
| 1. FÅRÖ.    | 7. HEINUM      |
| 2. RUTHE    | Båhl,          |
| Flåringe    | 8. STENKYRKA   |
| Bunge.      | Tingståde.     |
| 3. LEDEBRO  | 9. MARTEBO     |
| Helvi       | Lummelund.     |
| 4. HANGVAR  | 10. WESTKINDE. |
| Hall.       | Bro.           |
| 5. OTHEM.   | 11. FOHLE.     |
| Boge.       | Lokrum.        |
| 6. KELLÜNGE | 12. ENDRE.     |
| Walstena.   | Heideby.       |
|             | 13. BARD-      |



- 13. BARDLINGEBO.  
Ekeby.
- 14. FOLLINGBO.  
Akebäck.
- 15. ROMA.  
Biörke.
- 16. WENGE.  
tqntla.  
Guldrop.
- 17. SIONEM.  
Wickelou.

- 18. DALHEM.  
Ganthem.  
Halla.
- 19. HORSNE.  
Bara.
- 20. GOTHEM.  
Norrlanda.
- 21. KRÅKLINGBO.  
Anga.  
Ala.
- 22. NYGARN.  
Ardre.  
Gammelgara.

*PARS MERIDIONALIS.*

- 1. ATLINGBO.
- 2. WALL.  
Hougren.
- 3. STENKUMLA.  
Westerede.  
Tråkumla.
- 4. ESKELHEM.  
Toffa.
- 5. SANDA.  
Westergarn.  
Måsterby.
- 6. KLINTE.  
Fröyl.
- 7. HEIDE.  
Wethe.
- 8. GARDE.  
Ettelem.
- 9. ALSKOG.  
Lije.

- 10. NÅHR.  
Lou.
- 11. BVRS.  
Stanga.
- 12. FARDEM.  
Linde.  
Löystad.
- 13. LEFWEDE.  
Gierum.
- 14. EISTA.  
Sproge.
- 15. HABLINGBO.  
Silte.
- 16. HABDUM.  
Nås.
- 17. ALFWA.  
Hemfle.

H

18. RHO.

18. RHONE.

Eke.

19. GRÖTLINGBO.

Fide.

20. OYA.

Hambre.

21. WAMLINGBO.

Sundre.

## I.

In Cœmeterio templi FÄRÖ. Descr. d. 3. Jul. 1739.

ƲŃƆ: ƆƆƆ: ƆƆƆƆƆƆ: ƆƆƆ: ƆƆ: ƆƆƆƆƆƆ  
 ƆƆƆƆƆƆ: ƆƆƆƆƆ: ƆƆƆƆ. ƆƆƆ ƆƆƆ  
 ƆƆƆƆƆƆ: ƆƆƆ ƆƆƆƆ ƆƆƆƆ ... ƆƆƆƆ:  
 ƆƆƆ: ƆƆƆƆ: ƆƆƆƆƆƆ ƆƆƆ

GUD. NADI. LIFRAISAR. SIAL. AF. LIL-  
 MÖRTN. NICULASAN. BRODUR. SYNAIR.  
 LITU. GIRA. BITULFUR. SUM. KIRKIU. BUR-  
 TI --- GIRDI. MIK. GISUS. KRISTUS. NADA.

1. F. leg. *Lifreidar*. Nam *Lifrid* & *Lifred* est antiquis Gothis nomen proprium Viri, unde nomina villarum *Lifride*, in Paroeciis Anga & Alskog, vel *Lifrede*, ut in Low & Stanga.
2. Pagi, nomine *Martens* sive *Martini*, occurrunt quidem in Paroeciis Garde, Grötlingbo & Oja, nullus vero in Insula Färö. Habentur tamen ibi *Stora*-atque *Lilla-Gåsemora*; unde forte hoc loco contracte legendum est: *Lillmora*
3. Forte deest Syllaba. Quid vero heic intelligatur, non certo dixerim, *Mensane* Ecclesiæ sive ara vel altare, quod struxerat, an *Fundus* vel agri Parochiales ab eo exculti, an *Domus* Presbyteri

byteri five Plebani, quæ *Dos* vocabatur monachis, forte ejus cura & ope erecta, utpote Tutoris vel Jurati ecclesiæ, &c. Quod si, loco *burti*, legere liceret *bygdí*, & hiatus 3. punctorum suppleretur voce *han*; omnia plana forent & expedita. *Templum Fårðense*, extructum dicit Strelovius anno cló c LXVI. Sed dubito saltim de hodierno & præsentí, quod recentioris est structuræ, & plurimum differt a reliquis per Gothlandiam templis magnificentissimis. Neque Papismum sapit inscriptio Lapidis. Interea versio *Runarum* Latina ad verbum hæc fit:

Deus misereatur animæ Lifrídí de Lilmortni. Nicolai fratris filii (hoc monumentum) fieri curarunt. Bitulfus, qui templum condidit, fecit me. Jesus Christus misereatur.

II.

In Choro Templi RUTHE. Deser. d. 5. Sept. 1744.

==== THH: IRH: NHH: PHH: NHH: NHH:  
 HHHH: BRHH: NH: H: PHHHH: HHH  
 =====

--- TUIS. ARVAD. LITU. GIERA. STAIN.  
 UFIR. AUDUELI. BRODUR. SIN. A. FIN-  
 LANTI. OK ULAU  
 oaklau

- I. Idem credo, ac *Thijs*, quod & *Thees* scribitur; *Thewes* ac *Theus*. Nomen proprium masc. apud Gothlandos frequens, forte pro *Matthæus* ve-  
*Matthias*. H 2 2. Oedl

2. *Oedwald.* Hinc pagi *Odvals* in paroeeciis Fide, Biörke, Klinte, Linde & Stanga.

*Versio Latina.*

=== Matthias (☉), Arvidus curarunt adornari lapidem super (*vel pro*) Odvaldo fratre suo in Finlandia, &c. =====

III.

In cœmeterio Templi FLERINGE. Descr. d. 6. Sept. 1744.

† ÞNÞ: MÞI: #I#N11: H11F: H11Y: #11R:  
#N11H: #11: Þ11Y: 11: #NR1H: F11#1: 11R ===  
Þ11RI: #11#N: R=====R#11: N11=====N111=====  
B111R: Þ11Y: H11F1F: H11#11N: H11F: ===N1:  
#N1R1: 1R: B11F1F: Y11RI: Y11R#111: N11F: B1-  
1N1YR: 1.==IÞ1NÞ: R11YRÞ1: Y11==:#11.

GUD. NADI. HEGVAT. SIAL. SUM. HIER.  
HVILIS. HAN. GAF. ET. OVRIS. LAIGI. I. AR.  
.,.,. DAIRI. HELGU. R.,.,. RHET. TIL.,.,.,  
VATA.,.,.,. BEIAR. DAIM. SKAL. SEGIAS.  
SIAL.,.,. SA. HVERT. AR. BIDIN. FIRI. MAR-  
GETA. SIAL. BOTULFR. I.,.,. IDIUM. RY-  
FYRDI. MI.,.,. HIT.

Lapis hic sepulcralis, multis in locis mutilus, at notabilis, linea per medium ducta, in duas partes quasi divisus est, ob bina, quæ condit, funera mariti atque uxoris. Scriptura Lapidem ambit in extremis quatuor lateribus. Primum, videlicet occiden-

cidentalē, tria tantum prima verba continet, septentrionale vero & muro Templi contiguum reliqua usque ad R --- In tertio latere orientem versus & breviori tria tantum hæc verba legi possunt: *Rbet til. --- Vata ---*. Quæ sequuntur usque ad Botulfr exclusivē, ad quartum seu meridionale latus spectant. Ultima autem illa: *Botulfr* &c. in neutro adparent latere, neque ad Epitaphium pertinent; sed infra lineam primam in ipso saxo vacuo exarata additaque sunt, super capita defunctorum, a sculptore vel alio, ut ejus quoque maneret memoria. Ordini lectionem a vocibus: *Gud nadi*, & signum Crucis, illis præfixum, monuit & usus. Alias, cum in antecedentibus sermo sit in duali, incipienda forte fuisset ab his verbis: *Bidin firi Margeta Sial*. Sed prior sine dubio maritus obierat, facta tamen utriusque mentione in cippo, illa licet adhuc in vivis.

Obf. 1. Legendum procul dubio HEGVART, unde nomina Villarum *Hegwards* in paroecia Hall, & *Hagwards* in Follingbo. Nec dissimile est nomen *Hegvide* in Ledebro, Burs, Stanga & Wamlingbo.

2. S. d. pro *Landi*. Alias *Lage* notabat Gothis portum vel stationem navalem. Sed jam invenio ipsissimam vocem *Laigi* in Lege Gothl. Cap. LXIII. *þrigga Marca Laigi*, h. e. juxta versionem Hadorphii, *triggia marka Egendom*, Lat. tres marcas possessionis vel bonorum.
3. Vocem *HR* distinximus, vocatur enim *Ar* extrema & maritima pars Paroeciæ Fleringe, versus Corum, N. W.
4. *Vata* f. pro *Veta*, *vita*, h. e. scire vel observare.

5. Defunt omnino literæ  $\Psi\text{H}$  five MES. Plene *Sialmessa*, vox sub Papatu Nostris notissima, alias dicta *Årsmot*, Germ. *Yartijd*, Lat. *Anni-versarium*.

Sensus in hoc Cippo, ob lacunas, est utique obscurior: attamen, si non suppleri, juvari forsitan hoc modo possit, ad genium linguæ hodiernum:

Gud. nåde. Hegvarts. siål. som. hår.  
hvilas. han. gaf. et. Öris. Land. i. Ar - - -  
Deras. helga. rått. tilkommer. veta (*wakta*) at  
*åfwer* begge. dem. skal. fågas. siålmesse.  
hwart. år. Beder. för. Margareta. siål.

Botulfer. i. - - - idium. ry förde. mig. hit.  
h. e.

Deus misereatur Hagbarti animæ, qui  
heic quiescit. Dedit unam oram terræ in  
Ar - - - Jure itaque ecclesiastico observari de-  
bet, ut pro utriusque anima dicatur missa  
singulis annis. Orate pro Margaretae anima.

Botulfus in - - idium ry transtulit me huc.

#### IV.

In Templo LÉDEBRO. (\*) Defec. d. 1. Sept.  
1744.

A.

BIBIR: VARI: B\*1NIVHHR: NIF: INI:  
NHV: \*H: \*NIN:

BIDIR. FYRI. BOTLIKRRAR. SIAL. I. VIK.  
SUM. HER. HVILIS.

\*1R:

B.

†IR: RITI: 4†IIF:  
HAR. RITI, STAIN.

Ibidem in Coemeterio.

C.

BID†: ƳIRI: B†IAIN: NNY: IN ƳB†IIN†I-  
BIR†: IN ƳB†I.  
BIDN. FIRI, BOTVIU. SUM. BOTVIDA.

D.

†BIBIF. Ƴ†J: ƳARI. BNTI†I. NHI. 4Ƴ.  
BIER†I. NNY. †IR. †NIN.  
BIDIN. GÖT. FYRL BUTEIDA. SIAL, AF.  
BIERGI. SUM. HIER, HUILIS.

E.

†B†IIF: †I ƳR: I: †P†IB†: NIPR: †IR:  
N†IR: †P†I 4IƳ:  
BONTIN. OLAFR. I. AGHNABO. LIGR.  
HIER. UNTIR. HAKA MIK.

F.

BIBIR: IP†IR: B†IR: ƳIRIR: B†IN ƳN:  
N ƳIN: 4Ƴ: †I // // // // // N†I: NI: ƳIƳ: ƳIR†:  
BIDIR. IDRAR, BUNIR, FIRIR, BOTULFS.  
SMIS. OK. OL, // // // // SUN, LIT, MIK, GERA.

(\*) Hæo,

(\*) Hæc, una cum *Helwi*, quondam mea erat ruralis Ecclesia, & licet alibi de illa in *Gothlandicæ Historiæ Fasciculis* egerim, verbo tamen indicare liceat hanc ipsam, quæ posteriori ætate vocari scribique perperam cœpit *Læderbro*, olim dictam fuisse *Ledebro*. Probo hoc, inter alia, ex veteri & pretioso epitaphio Gothico, heic sito: *Ego. Botvidus. Curatus. LEDHUBRO. credo. quod. Redemptor. meus* &c. Ipsa quoque ratio suadet, potius a *manuducendo*, h. e. fulcimentis (Sveth. *Ledstänger*), queis Pons vetus, jam enim eo opus non est, munitus in commeantium securitatem, fuerat, nomen esse derivandum, quam a *Coxio*, *Låder*, vel bovinis pellibus, ceu nobis persuadere cupit Strelovius pag. 34. hoc ipso non absimilis Utrajectinis in Belgio, qui tale quid de æde sua S. Mariæ, tempore Papatus, fabulati sunt, addita in tabella *Bovis* effigie, cum anno clocxix. & hoc disticho:

*Accipe posteritas, quod per tua secula narres,  
Taurinis cutibus fundo solidata columna est.*

*Ledebröense* templum & amplum est & splendidum, sive externam spectes formam sive internam. Tres ibi Subfelliorum ordines, unus in medio, ad latera reliqui. Lapis A. ad australe latum cernitur, B. vero in aquilonari, quod sceminarum est, & quidem in nono subfello, si a Choro numeres. Observetur in specie

#### Ad Lapidem A.

1. Nomen s. d. compositum, cujus pars posterior convenit cum *Likkair* dicto *Snelli*, de quo Hist. vetus Gothl. cap. 3. nec non cum *Leiknir*, intra in Cippo Hangvarenfi A. *Leiker-beide* vel *Lækker-bede* campus est non procul a templo *Lede-*



Ledebro, ubi cum S. Olavo olim pugnasse putantur incolæ.

2. *Vik.* Est villa hujus Paroeciæ, *Wikers* dicta hodie, eaque duplex, *Stora & Lilla Wikers*. Nomen habet a sinu maris ad portum *Capells-bamn*, cui adjacet. Locus, quem iste lapis ornat, sepulchralis adhuc *Wikenstum* est, hæreditario jure.

*Versio Latina.*

Orate pro Botleikari anima in Wik, qui heic quiescit.

*Lapis B.* Quæ sensum ordiuntur & claudunt, longo usu sunt detrita. Plura ergo legi nequeunt quam ista pauca, h.e. Sculpsit lapidem.

*Lap. C.* Sculpturam habet, ut & sequens, circulem, sed paullo obscuriorem, ut nil certi inde erui posse videatur, præter ista: Orate pro Butvi, quæ

*Lap. D. 1. Got* pro *Gud.* Ultima runa 1 est inversa.

2. *Biergi.* Villa hujus Ecclesiæ, vocatur hodie *Biers* contracte pro *Bierges*, estque duplex, *Stora-och Lilla Biers*. Gothlandi montem vocant *Bierg*, interposito *i*, more veterum, non *Berg*, ut nos hodie.

*Versio Latina.*

Orate Deum pro Buteidæ anima de Berge, quæ heic quiescit.

*Lapis F. 1. Bonde,* proprie *Rusticus* hodie, vel plebejus Agricola: sed olim apud Gothos magnæ dignitatis titulus, ut notissimum.

2. *Aghnabo,* sed scribendum fuisset ᐱᐱᐱᐱᐱ *Augelbo*; sic enim recte & scribitur & pronuntia-

tur hodie. Est ampla & nobilis Villa prope templum Ledebroënsē sita, notatque *Anglorum sedem* s. domicilium.

3. Nomen sculptoris addi solitum, heic deest. Si *Haga*, proprie particula terræ circumscripta, metaphorice acciperetur pro tumulo vel sepulcro, legendum dicerem: *haga min*, nam est ibi *Þkaun* punctatum. Sed præstat prius. Runa *Madur* *ψ* in ultima voce altero caret brachio.

*Versio Latina.*

Olaus colonus in Angelbo jacet heic infra. Sculpsit me.

*Lapis F.* 1. Dantur XXIII. villæ in Gothlandia, nomine *Smifs* & *Smits*. Lapis iste in quatuor partes fractus, partemque mutilus, extra valvas australes templi jacet, occidentem versus.

*Versio Latina.*

Fundite preces vestras pro Botulfo Smis, & Ol --- filius curavit me fieri.

V.

In muro Templi HELVI. (\*)

ᚠᚱᚱᚱᚱᚱ. ᚱᚱᚱᚱᚱ. ᚱᚱᚱ. ᚱᚱᚱᚱᚱᚱᚱ. ᚱᚱᚱᚱᚱ.  
ᚱᚱᚱᚱᚱᚱ. ᚱᚱᚱ. ᚱᚱ. ᚱᚱᚱᚱᚱᚱᚱ.

LAFRANS. BOTVAR. SUN. MAISAERA.

GERDI KIRIRKIV. DISA. AF. USKINAIM.

(\*) *Helvi* ne potius pro *Helgawi*, an *Helvig*, an *Helvik* dicenda sit hæc ipsa Ecclesia, priori, quam modo nominavimus, *Ledebro* sub uno Pastore connexa,

nexa, hoc loco non disputabimus; nam alibi de hoc fufius, ubi fimul de *Helvetiis* & prisca *Helviorum* gente, qui Straboni *Ἑλαιοι*, *Ἑλαιοῖσι*, Plinio *Hillevionnes*, Tacito *Helvecones* &c.

Nullum vero, five intra five extra muros hujus templi, datur epitaphium *Runis* exaratum; ejus tamen loco, aliam heic substituímus *Inscriptionem* supra exterioris templi valvas. Simile exemplum vide infra in *Fohle*, & aliud occurrit apud Trog. Arnkiel, Cimbr. Heidenth. Part. IV. p. 55. de templo *Brondeslöf*, Dicec. Alburgensis in Jutlandia, ubi in muro exteriori versus meridiem, hæc leguntur: ΠΙΡΥΗ: †R: ΠΡΙ-  
 Η††: Π†††: Ψ††Ψ: i. e. ad ejus versionem, *hoc templum adjudicatum est Christianis*. Conf. m. Ol. Wormi Mon. Dan. p. 295.

Singulares autem sunt hæ nostræ quædam *Ru-  
 næ*, v. g. *R. D. P. & Λ* infra caufum, quæ pictura recedit a prifcorum more. Verba præterea una ferie confcripta sunt, nulla aut fane perexigua interpunctiõne adhibita, quod magnam fenfum investigandi difficultatem peperit. Nos tamen, ut potuimus, unico puncto, in Lectorum gratiam, voces diftinximus. Nota infuper

1. *Lafrans*. Alias *Lafvers* & *Laffes* etiam, h. e. *Lars*, *Laurentius*.
2. Hæc vox multis conjecturis locum dedit. Forte legi poffet *Matsarfe* vel *Mangsarfe*, cujus nominis plurimi dantur in Gothlandia pagi; at nullus in Helvi neque in Westkinde. Sunt alias in parœcia Helvi duæ villæ, dictæ *Ihre*, major & minor. Hoc nomen optime quidem responderet ultimis literis *Era* vel *Ira*: fed quid erit tunc antecedens *Maisa*? Omnino *Maiza* Goth.

idem est ac *major*, vid. Verf. Ulphilæ Luc. VII. 28. & sic habemus *Stora Ibre*. Sed hæret adhuc aliquid. Magis ergo placet illud *Mifferi* & *Miffere* apud Verelium in Indice Lingv. Goth. p. 174. h. e. *tempus indefinitum*. Nam voluit forte hoc ipso auctor indicare, se non breve tempus huic operæ impendisse. Verum, missò etiam hoc, & addita una litera *t*, lego *Maistara*, h. e. Magister, artifex sc. murarius, nobis hodie *Mur-Mæstare*. Dices forsan hunc titulum antiquis fuisse ignotum? Sed habet Verelius Loc. cit. *Meistari*, Magister, licet vocem *Maister*, *Mæstare*, non tam a Latinorum lingua, quam potius a Goth. *maist*, *mäst*, derivandum putem. *Mäst förfaren* h. e. maxime peritus artis, ille debet dici *Mæstare*. Conf. Franc. Junii Etymol. edit. noviss. Oxon. 1743. *Hildebrandus*, Pugil ac comes R. Theoderici Veron. vocabatur *Meistari*, causam vide in Wilk. Saga. Cap. 168. At ætas templi *Helvi* incidit in an. clo cc XLIX. si fides est Strelovio p. 142.

3. *Kirirkiu* pro *Kirkiu*. Abundat *ir*.
4. *Af uskinaim*. Putavi idem esse ac Suethice: *af aldeles nyo*, h. e. *totum novum* vel *de novo* sc. exstruxit. Id postulare videbatur contextus, atque tunc optime illud prius *Maisa-Era* transferri posset per *Stora* vel *Större-Ibre*. Sed destituto idoneis testimoniis pariter ac tempore heic aqua hæret. Redeo igitur ad veterem conjecturam, nempe quod *Uskinaim* scriptum sit pro *Veskindum*. Integra non modo est parœcia, sed prædium quoque seu villa ibidem ejusdem nominis, unde forte erat Artifex. Scribitur hodie *Westkinde* cum *t* in *vest*, sed eodem modo, ac heic, expri-

exprimitur nomen illud, sc. sine t, tam in antiquo Catalogo Parœciarum, quam in sequenti Epitaphio cœmeterii Helvientiſis, literis antiquis, dictis vulgo monachalibus, exarato: HEIC. HELVI CURATUS. HALDVATUS. VOCIFERATUS. VESKINDIS. NATUS. JACET. HOC. TUMULO. TUMULATUS. JAM. CONSUMATUS (sic) SIT. CHRISTO. CONSOCIATUS. Simpliſſima ergo lectio noſtri lapidis hæc erit:

*Lafrans. Botvar. ſun. Maiftera. gerdi. kirkiu. diſa. af. Veſkindum.*

*Verſio Latina.*

Laurentius Botuari filius, artifex de Veſkinde, conſtruxit hoc templum.

VI.

In cœmeterio Templi HANGVAR:

A.

NIIVNIR\* RTHI\* HTIT\* FY BRE VIIRDI\*  
 IBIR\* THIN\* VIBNR\* NIT\* FY NBTIR\* NIT\*  
 FY\* BRIBNR\* HIT\* FY IBIR\* ITHRI \*

LEIKNIR. RAISTI. STAIN. OK. BRO. GIER-  
 DI. EPTIR. LEIAU. FADUR. SEIN. OK. UPTIR.  
 LINGORM. BRODUR. SIN. OK. IPTIR. IOLARA.

B.

PHINIBR. \* BAINIBR. VANNIT. \* DDIR.  
 NIN. \*HT. IT. NHT. \* NR. NIT VIBNR.  
 BNDIR. HTIT. PNB. HNNHMMNR. \*HT. PHT.

𐌵𐌿𐌹. 𐌸. 𐌺𐌹 𐌳𐌹𐌹 𐌹. 𐌸. 𐌲𐌹𐌹𐌿𐌹𐌹𐌹𐌹. 𐌸. 𐌿𐌹  
𐌶𐌳𐌹𐌹𐌹𐌹𐌹. 𐌸 𐌹𐌹𐌹𐌹𐌹.

GANVIDR. OK. BOTVIDR. KASLLA. OK.  
DAIR. LETU. HAKA. AN. STAIN. OK. YFR.  
SIN. FADUR. BUTAIR. AITIN.<sup>2</sup> GUD. AISS-  
VALTUGR. HAFL. DINA. SIAL. OK. DA.  
VARI.<sup>3</sup> OK. B.I.RIMSTEFR.<sup>4</sup> OK. FIR SUNU-  
P  
TAGR. OK EN HATO.

C.

𐌶𐌹𐌹𐌹𐌹𐌹𐌹: 𐌿𐌴𐌹𐌴𐌹: 𐌸𐌹: 𐌴𐌹: 𐌿𐌹𐌹: 𐌿𐌹𐌹: 𐌹𐌹𐌹𐌹:  
𐌳𐌹𐌹: 𐌵𐌹𐌹: 𐌵𐌹𐌹𐌹𐌹: 𐌿𐌳𐌹: 𐌴𐌿𐌹: 𐌸𐌹𐌹:  
𐌵𐌹𐌹: 𐌺𐌹 𐌳𐌹𐌹 𐌵𐌹: 𐌲𐌹𐌹𐌹𐌹: 𐌵𐌹𐌹𐌹𐌹: 𐌸𐌹: 𐌹𐌹𐌹:  
----- 𐌹𐌹𐌹

SITRAIFR. I. FLINAVIK.<sup>1</sup> HAN. LIT. MIK.  
GERA. YFIR. SIN. <sup>3</sup> JAKAUB. GUD. NADI.  
HANS. SIAL. DA VAR UB. BRODUR.<sup>4</sup> STAIFR.  
OK. DASS <sup>5</sup> TAIR.

D.

𐌸𐌹𐌹: 𐌸: 𐌵𐌹𐌹𐌹𐌹 𐌿 ○○○ 𐌿 ○○ 𐌴𐌹𐌹𐌹:  
𐌳𐌹𐌹: 𐌴𐌹𐌹: 𐌿𐌹𐌹: 𐌿𐌹𐌹: 𐌳𐌹𐌹: <sup>5</sup> 𐌿𐌹𐌹𐌹𐌹:  
𐌵𐌹𐌹 <sup>5</sup> 𐌿. 𐌸 <sup>5</sup>

NAIF.<sup>1</sup> OK. JAKAUBR. Fra Fle<sup>2</sup>. NAVIK.  
DAIR. LITU. GERA. MIK. YFIR. <sup>3</sup> L. FA-  
DUR. SIRAI<sup>4</sup>F. OK <sup>5</sup>

Ex quatuor hisce Cippis *A. B. C. D.* unicum duntaxat, sc. *B.* nobis, ob pluvium cœlum, describere dabatur die 30. Aug. 1744. Ceterorum Lectiones dederunt alii, sed paululum variantes, unde elegimus verisimillimas, collatis probe circumstantiis. Stockholmia in Reg. Archivo Antiqu. vidi ante aliquot annos duorum ex *Hangvarianis* lapidum elegantes delineationes, sed quinam fuerint, jam non succurrit. Possunt, si placet, conferri. Observetur vero in specie

*de A.*

1. *Leiknir.* Dantur in Gothlandia pagi *Liknatte* vel *Lignatte*, nam fuit olim *Liknatus* nomen proprium virorum, ut ex Lapide quodam Stenkyrkensi evidens est. Datur etiam *Lekare* in Sanda & Nâr, forte a nomine masc. *Leek*; sed an huc quadrent, nescio. Plura supra in *Ledebro*, Lapid. *A.*
2. Non quidem in scriptura Runica hæ voces ita distinguuntur; at debent tamen. Nam plurima, in aliis Regni provinciis, hujus formulæ vel, ut ita dicam, *Pontificationis* exempla inveniuntur, ceu videri potest in *Actis Lit. Suec.* & apud Cipporum runicorum Collectores passim.
3. *Leiav.* Vix genuinum; f. tamen cum hoc aliquid commune habet villa *Leiwes* in parœcia *Lewede.*
4. Alii legunt  $\text{H}^{\text{N}}\text{†}$  *sun*, sed malim  $\text{H}^{\text{I}}\text{†}$  *sin*, ut mox infra scribitur.
5. Idem credo, quod vulgo dicitur *Olar* pro *Olof.*

*Versio Latina.*

*Leiknir* erexit lapidem & pontem fecit in memoriam *Leiavi* patris sui, & *Lingormi* fratris sui, & *Olavi*,

*Ad*

*Ad Lap. B.*

1. Innuitur insignis hujus Parœciæ Villa, dicta *Kasle*, a qua totus vicinus tractus silvestris vocatur hodie *Kasle-branden*, utpote incendio quondam læsus, ceteroquin collibus sepulcralibus lapidumque stratis fere innumeris repletus. Testes sunt, & quidem visu digni, magna olim stragis hoc loco editæ Piratarum, quorum peraptæ videntur fuisse non procul hinc stationes & receptacula.
2. *Aitin* h. e. Dominus, ab Ebr. אדון *Adon*, & hinc etiam sine dubio *Audin*, *Athin*, *Othin* & *Odinus*. Sed *Atta* Goth. Pater.
3. Al. leg. † h. e. L. sed in vet. quodam ectypo non habetur, nec sequens *ok*.
4. Proprie *Rimsefr* sine t, vel ut alia habet lectio, *Rimsifr*, quasi Siphra & numerus Runicus; at videtur legendum *Stafr*, ut infra quoque in lapide C. Notat autem *Rimstafr* sive ipsam Runam & Literam, sive Scipionem h. e. Kalendarium Runicum, unde hæc temporis supputatio est petenda, collato valore Runarum arithmetico. Nos nullam, relicto spatio, malumus, quam dubiam & incertam tradere verborum explicationem. Multum tamen lucis dabit *Cippus Lyeensis*, infra ad partem Gothlandiæ meridionalem perticens. Habeo quoque *Kalendarium* Runis exaratum, & ex vetusta membrana in Gothlandia descriptum, ubi ad calcem, simili fere modo, extat:  
 𐀀𐀁𐀂. R. 𐀃𐀄𐀅𐀆. †. Ψ. BRIVHIVIR.  
 I. 𐀇𐀈𐀉𐀊𐀋𐀌. RIVIR. Sensus fere hic erit: *Ta. var. R. Suntagr. ok. M. Primstafer. i. Siektondo.* (h. e. Sextonde) *rado*. Annus, hisce indi-



indigitatus, putatur fuisse clccccxxi. Sed de his plura alibi. Quid ultima vox *hato* dicere velit, ignoro, nisi legendum *h'lf* vel *rado*. Cohærent v. sine interpunctione, in nostro cippo ultimæ runæ una cum *ok*. Capiat, qui potest.

*Versio Latina.*

Ganvidus & Botvidus de Kafsia. Et illi curarunt sculpi hunc lapidem Patri suo Butero. Dominus Deus omnipotens habeat animam tuam. Et tunc fuit &c.

*Ad Lapidem C.*

1. Si interponatur *V* seu *g*, non multum differt a nomine pagi *Sigtris* in Parœc. Habdum. At potius forsan legendum *g* pro *t*, *Sigraifr*, & sic convenit cum villis *Sigrefs* vel *Sigreps* in Westerede & Wamlingbo, pro quo alibi scribitur *Siglefs* & *Sigleps*.

2. Hodie dicitur *Flenwiker*, & est pagus hujus Parœciæ Hanguar. Ibi quoque *Portus*, de quo Vet. Chron. Rhytm. (*Rim-Krönikan*) pag. 381.

*Tba Magnus (Gren) siglade i Flånawik,*

*Ther göra Landgång tröste han sik:*

*The gingo sedan för Wisby Stad. &c.*

3. Nullum dubium, quin desit *VAFNR*, *Fader*, *Pater*.

4. Hic plene *Stafr*, sed *i* abundat, nisi sit ob plur. *Brodur* *Stafr* vero nonne idem ac *Literæ sociæ*, h. e. *Simul tunc erant Literæ V & B*. Dispiciant alii. Reliqua defunt.

*Versio Latina.*

Sitraifr in Flinawik fieri me fecit Patri suo Jacobo. Deus misereatur ejus animæ. Tunc erant V, B. simul literæ, & &c.

*Ad Lap. D.*

1. *Naif*, Infolens & suspectum.
2. Ob runam  $\Psi$ , lego *fra*, loco  $\uparrow$  vel *in*, ut in priori.
3. Omnino legendum *Flē* vel *Flenavik*, ut in cip-  
po antecedenti.
4. Sic quoque  $\text{HIRAI}\Psi$ , qui modo in vetustiori C.  
vocabatur *Sitraitr* vel *Sigraitr*. Est enim unus  
ac idem Vir, & qui *Filii* ibi personam egit atque  
officium, hoc loco honoratur ut *Pater*.

*Versio Latina.*

*Naif* & *Jacobus* de *Flinavik* curarunt  
me fieri in memoriam *Siraifi* (*Sigraifi*) *Patris*  
eorum, & -----

## VII.

In cœmeterio Templi HALL.

## A.

† PND: MPI: IMTH: HHT: IW: #IRINΨ:  
#HΨ: 1AIRIR: MHN: YIRI: YIW:

GUD. NADI. JVANS. SIAL. AF. HIERNUM.  
HANs. TYTRIR. LITU. GERA. MİK.

## B.

† HYNTHI: HYE: VIRI: #IV HHT: IMI:  
EMVTHI HT #MTRAE IW: #IV NDADR: THH  
DIR: RTHHNI.

*Ad Cippum A. obs.*

1. Nullus hodie pagus *Parœciæ* Hall dicitur *Hiernum*,  
neque alibi invenitur, excepto uno in *Parœc.*  
*Burs*, nomine haut multum dissimili, *Kierna*; solet  
enim *Runa* \* halg vel hagl etiam accipi pro k & g.  
verum

verum est ille nimis hinc diffitus. Aut ergo intelligenda heic est villa *Gannarfe*, quæ in Hall, aut, quod potius crediderim, *Ihre*, quæ ad Parœciam olim vicinam Elingheim, at templo ibi deinceps antiquato, hodie ad Parœc. Hanguar pertinet, estque duplex, *major & minor*. In Protocollo Conf. Wisb. ad an. 1601. invenio illam vocatam fuisse *Eire*, nam *i* apud Gothlandos pronuntiatur plerumque ut *ei*. Et hinc m. Portus *Eirewik* ibidem. Facilis autem, fuit literarum transpositio, & frequens præterea prisca terminatio in *um*.

2. Litera irregularis  $\Psi$  sine dubio, posita pro ordinaria  $\Psi$ . Sensus id exigit.
3. *Tytrir*. Legendum puto *Dytrir*, h. e. *filia*, cum forte filis, fratribus parentibusque caruerit defunctus. sing.  $\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow$  *Dotur*, infra N. IX. B.
4. Alii habent  $\Psi\Psi$  *mik*, alii non. Delineatus idem hic cippus conspicitur in Reg. Archivo Antiqu. Sed ab initio ante *Gud*, ibi perperam legitur  $\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow\uparrow$ , & in fine duæ voces desunt.

Ceterum circulus, in medio Lapidis fere quadrati sculptus, hæc verba supra allata in suo ambitu continet; ita tamen, ut dimidia pars circuli sit vacua.

*Versio Latina.*

Deus misereatur animæ Johannis de Hier-num (Ihre). Filia ejus curarunt me adornari.

*De Lapide B.*

Hunc Lapidem, æque ac priorem, oculis non ipse usurpavi. Aut nimium erravit Scriptor, quod minus tamen credo, cum fuerit in aliis fidelis, aut certe primus dormitaverat Sculptor, mutando atque transponendo non solum literas, sed, ut videtur, in-

tegras etiam voces, more forsitan vett. Skaldorum. Præter *Nicolai animam, uxorem & filios*, pleraque meræ sunt tenebræ, in quibus reptare diu non lubet.

## VIII.

In Templo OTHEM. Descr. d. 10. Sept. 1744.

A.

\* I: RBIDIR: YFN: VRRI: YR#11N: NHR:  
YV #11Y: YVY

I. R. BIDIN. GOS. FYRI. MARGITV. SIAL.  
AF. OTAIM. AMIK.

Ibidem in cœmeterio.

B.

† I: R BIDIR: VRRI: #11N1RN: NHR: B#1-  
111: I: Y#11B#: NRY: HIR: N1IR: N11N:

I. R BIDIN. FYRI. HALVARS. SIAL. BON-  
TANS. I. KHANBO. SUM. JEAR. UNTIR.  
VILAS.

C.

‡ BIDIR: Y#DT: N1111: NHR: I: Y11RY:  
BIDIN. GODT. LINATA. SIAL. I. FILUM.

D.

==== IRIBI: I==†

E.

† BIDIR: YFN: VRRI: #11YD1N: NHR: YV  
Y111: NRY: 1R111N N1

BIDIN. GOS. FYRI. NIKULAS. SIAL. AF  
KEITI. SUM. ER VILIS UTI.

Lapis A. I. Gos pro God vel Gud, & sic Lap. E. sed  
in C. scribitur Godt.

2. Magr.

2. Magna villa, non procul a Templo sita, vocatur hodie *Othmar*, contracte pro *Otheimar*, cum terminatione veteribus usitata in *ar* post *heim*, ut in *Arheimar*, *Alfheimar*, *Jotunheimar* &c. in Herv. Saga alibique. Sub initia Christianismi habitaverat hoc loco magnæ dignitatis ac locuples Vir, qui de suo prædio *Otheim* vel *Otheimar*, nomen dedit toti Ecclesiæ, hodierno tempore dictæ, molliori sono, & *Othem* & *Othum*. Est quoque credibile, eum structuræ Templi plurimum, forte etiam fundum ipsum, de suo contulisse. Conditum autem illud anno cl̄ LXXXVI tradit Streløv. p. 140. Præalta turri ornatum est, & cetera nitidum ac pretiosum, quod vel ex ara judicari possit. Mensa enim, qua instruitur, ex integro saxo, & quidem candidissimo politissimoque marmore confecta, ulnas continet in longitudine 4. in latitudine  $1\frac{3}{4}$ . atque  $\frac{1}{4}$  respectu profunditatis. Adponam, *nomini* gratia, Epitaphium in medio Choro hujus templi litt. Goth. *Otheim, curatus jacet hic Nicolaus humatus, in terris gratus, sit celis intavolatus. Obiit anno cl̄ccc xxxvi. xi. Kalendas marcii* ✚

3. *Amik* aut pro *Amen*, aut pro *ok mik*, h. e. *etiam pro me*, sc. orate, aut potius pro *baka mik*, i. e. sculpsit me, ut sæpius alibi.

*Versio Latina.*

Orate Deum pro anima Margaretæ de Othaim, -- me.

*Lapis B. 1.* Deest ab initio litera una, neque constat, quis sit ille locus. cetera clara.

Orate pro anima Halvari, coloni in *khanbo*, qui heic infra quiescit.

*Lapis C.* 1. *Linata*, masculinum nomen sit, idem ac *Liknate*, de quo supra, an foeminarum pro *Lena* & *Helena*, incertum. Deest vox *fyri*.

2. *Filum*. Villa hujus Parœciæ, hodie *File*.

Orate Deum pro anima Linati in File.

*Lapis D.* Nihil habet integri.

*Lapis E.* 1. *Keiti*. Nisi intelligatur pagus *Klint* vel *Klinte*, neque ad nostram Parœciam, neque ad ejus Annexam *Boge* pertinet.

2. *Er* pro *ber* & *ber*.

3. Recte quidem, at sapius *untir*.

Orate Deum pro anima Nicolai de Keiti, qui heic quiescit.

## IX.

In Templo WALSTENA. (\*) Descr. d. 22. Febr. 1742.

## A.

†NƳR: BIFƳR: NIT: ƳIRI: ƳIF: NƳIR:  
†IRBITR

OLAFR. BINGIR. LIT. GERA. MIK. YFIR.  
HERA PITAR.

## B.

HIFƳRIDR: I: IFƳINI: NIT: ƳIRI: HIFIF: †HIF:  
NƳIR: BNT†IDI: ††NR: HIM: †F: NƳIR: IF-  
†IF: †F: B†IFIF: I: †RDRƳIRDIF †

SIGFRIDR. I. ALFINI. LIT. GERA. STAIN.  
HISAN. YFIR. BUTHIDI. TOTUR. SINA. OK.  
UFIR. AULAEF. OK. BOTLILNI, I. NORDR-  
GARDUM. †

(\*) Ple-

(\*) Plene dicitur *Walgustein* hæc Parœcia, & sic olim quoque, multis antiquitatum monumentis memorabilis, sed quæ huc non pertinent. Lapidés sequentes lectu non sunt difficiles, habent enim ambas suas claves, h. e. ejusdem sensus Inscriptiones, literis antiquis monachorum *latinaque* lingua, in utroque adpositas. Et videntur cognati superstites isto idiomate ac scriptura peregrina minus fuisse contenti, ideoque ex suo genio ac more patrio, addidisse *Runicam*. Est præterea & hoc observatu dignissimum, quod ætatem habent expressam, unde concludi circiter possit de reliquis, eos neque esse vetustissimos nec plane recentioris ævi, siquidem præsentes quatuor jam expleverunt secula.

*Lapis A. I. Bingir.* Legi debet Bingil, quod partim ex Lat. epitaphio constat, partim quia prædium *Bingel* in Parœcia vicina Gothem sit hodie quoque notissimum, unde erant uterque, defunctus *Petrus* & qui monumentum posuit, forsitan pater vel proximus ipsi *Olavus*. Duplex autem ibi datur hujus nominis prædium, *Bengte-bingel*, quod hoc forte loco intelligitur, & *Ny-bingel*, sine dubio, post illa tempora, divisus agris, enatum. Possit forsitan huc etiam referri tertium ibidem, dictum *Kyrke-binge*.

2. Facile ex hac voce, puncto ac divisione destituta, aliquis *Fernbiter*, ferrivorus extitisset, nisi Latina inscriptio nos docuisset, hoc ipso, facta distinctione, intelligi Dominum Petrum, *Herr Pebr*. Sic enim illa: *Anno Do. cljccc l. obiit. Dns. Petrus. curatus. ecclesie. in Walgusten. dictus. Bingilde. Gaudem. cujus. anima. sit. cum. Christo. amen.* † Scripturæ vero Runicæ hæc erit

*Latina*


*Latina Versio.*

Olavus *de* Bingel adornari me curavit in  
memoriam Domini Petri.

- Lapis B.* 1. Est villa ampla hujus Parœciæ Walgesten,  
quæ dicitur adhuc *Alfwene*.
2. Nomen in Gothlandia frequens fœminarum *Butvi*  
& *Butey*. Omittitur hoc nomen filiæ Sigfridi in epi-  
taphio Lat. Ergo Pater id in sua editione addidit, &  
quidem primo loco.
3. Runa † *Tyr* proprie notat *t*, sed usurpatur etiam sæ-  
pe pro *d*, ut commode legi possit *Dotur*, filia. Sic  
supra N. VII. A.
4. Lat. vocatur *Autleus*; ut dubium sit, *Olof* dicendus,  
an *Adolf* vel aliter. Elegimus lectionem Latinam.
5. Suspicio runam compositam † in hoc nomine scri-  
bendam fuisse † contracte pro *gn*; nam melius tunc  
conveniret cum Lat. *Bothlingis* vel *Bothlignis* infra.  
Sine dubio idem nomen fœm. ac *Bothildis*, & bre-  
vius apud Gothlandos hodiernos *Boel*, *Boild* ac *Boll*.
6. Vocatur istud prædium hodie *Norgårde*, & perti-  
net ad ecclesiam *Walstena*. Epitaphium Lat. de quo  
supra, in eodem saxo exaratum ita se habet: *Anno*  
*Dni. cl. ccc. xxvj. obierunt. Autleus. Bothlignis. que.*  
*in Norgardum. &. filia. Sigfridi. quorum. anime. re-*  
*quiescant. in. pace.*

*Versio Runarum Lat.*

Sigfridus in Alfine hunc lapidem sculpi cu-  
ravit in memoriam Buthidæ filiæ suæ, & Aut-  
levi & Bothlingæ in Norgardum.





#  
P L A N T Æ  
C O L D E N G H A M I Æ

In Provincia

NOVEBORACENSI AMERICÆ

Iponte crescentes, quas ad methodum Cl. LINNÆI  
Sexualem, anno 1742. &c.

Observavit & descripsit

CONWALLADER COLDEN.



Illustris Auctor Americam adiit ante  
40. annos, non superficiali Botani-  
ces cognitione imbutus, nihilominus  
latuere ipsi plantæ in novo orbe cre-  
scentes, quas nulla ratione ad gene-  
ra & species amandare potuit; hinc  
seposuit Botanices sacra per annos

triginta, dum in manus Ejus incidunt opera Cl. LIN-  
NÆI botanica, secundum cujus principia incepit plan-  
tas feliciter & facile examinare atque detegere, & ad  
genuinas familias reducere; Hac ratione Plantarum  
Coldenhamensium collectio nata est.

Plantas sic graphice delineatas misit illustris Au-  
ctor ad Cl. J. Fr. Gronovium & hic ad Linnæum  
nostrum, qui demum ab auctore obtinuit veniam has  
publici juris faciendi.

D I A N D R I A

MONOGYNIA.

I. VERONICA foliis inferioribus oppositis ovatis; su-  
perioribus lanceolatis alternis, floribus solitariis.  
*Linn. cliff. 9. Gron. virg. 4.*

L

CAL.

CAL. *Perianthium* quadripartitum, usque ad basin, persistens; laciniis lanceolatis.

COR. *Petalum* unicum. *Tubus* brevissimus. *Limbus* quadripartitus, planus; laciniis ovatis: infima minore.

STAMINA duo.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* unicus. *Stigma* simplex.

PER. *Capsula* cordata, compressa, bilocularis.

SEM. plurima.

*Folia* ovata, integra, inferius opposita, superius alterna.

*Flores* singuli pedunculis ex foliorum superiorum angulis.

*Caulis* simplex, vix pedalis.

2. VERONICA cauliculis procumbentibus, foliis linearibus.

CAL. *Perianthium* quadripartitum, laciniis lanceolatis, acutis; persistens.

COR. *Petalum* unicum. *Tubus* brevissimus. *Limbus* quadripartitus; laciniis ovalibus: inferiori minori.

STAM. *Filamenta* duo, corollæ inserta.

PIST. *Germen* globulare. *Stylus* longitudine staminum.

PER. *Capsula* compressa, verticaliter cordata; margine membranaceo, pellucido, acuto; bilocularis.

SEM. Duo, parva, (sed de numero incertus sum).

*Caulis* tetragonus, procumbens.

*Folia* sessilia, bina opposita, longa, lanceolato-linearum, rigosa.

*Flores* in spica laxa ex alis foliorum, pedunculis longis insistentes.

3. VERONICA foliis quaternis quinisque. *Linm. cliff.* 7. *Gron. virg.* 4. *Nostratibus* Indian Physick.

CAL.

**CAL.** *Perianthium* quinquifidum, parvum, persistens; laciniis lanceolatis.

**COR.** *Petalum* unicum. *Tubus* cylindræus, calyce triplo longior. *Limbus* parvus, quadrifidus; laciniis ovatis, æqualibus.

**STAM.** *Filamenta* duo, longa, corollæ inserta, extra corollam veluti duo cornua prominentia, a se invicem declinata. *Antheræ* globosæ.

**PIST.** *Germen* ovatum. *Stylus* unicus, filiformis, longitudine corollæ, post occasum floris persistens.

**PER.** *Capsula* oblonga, ovata, apice acuminata, duobus sulcis longitudinalibus cavata, bilocularis, (nec cordata, nec compressa).

**SEM.** plurima, ovata.

*Folia* quinata, verticillatim posita, lanceolata, tenuiter ferrata, vix petiolata, acuminata, fibra unica longitudinali ramulos laterales alternatim emittente.

*Flores* in spicis pluribus, densis, erectis, caulis terminatricibus; pedunculis brevissimis. *Foliolum* unicum, lanceolatum, ad exortum pedunculi.

*Caulis* simplex, sæpe sexpedalis, foliis per totam longitudinem verticillatim positus.

*Radix* fibrosa, perennis.

Crescit in humidis.

**OBS.** *Hæc Planta tota facie a Veronicis diversa: & cum partes fructificationis etiam diversæ sunt, ad diversum Genus referenda; vel distinctum Genus constituendum.*

*Decocto Radicum hujus plantæ frequentius utuntur Nostrates ad purgandam alvum ab Indigenis docti.*

4. **VERBENA** caule erecto, foliis ovatis ferratis, binis oppositis, versus petiolum semel vel bis laciniatis,

tis floribus cæruleis in spicis erectis tenuibus caules terminatricibus dense fitis. An Clayt. n. 431? (Verbena tetrandra spicis longis acuminatis, foliis hastatis. *Linn. upsal.* 8.)

Habitat in humidis.

5. VERBENA caule erecto, foliis ovatis serratis binis oppositis, floribus albis in spicis filiformibus horizontaliter positis sparsim fitis. (Est Verbena tetrandra, spicis filiformibus paniculatis, *Linn. upf.* 9.)

Habitat in aridis.

6. LYCOPUS foliis lanceolatis serratis vix petiolatis glabris: versus basin aliquando profundius laciniatis.

7. MONARDA caule acutangulo, capitulis terminalibus. *Linn. cliff.* 495.

*Nostratibus* Red-Mint. *Incolis Novæ Angliæ* Assyrian-Baulm.

CAL. *Perianthium* monophyllum, tubulatum, cylindraceum, striatum, coloratum, persistens: ore quinquedentato.

COR. *Petalum* unicum. *Tubus* cylindraceus, calyce longior. *Limbus* patens, parum compressus, non ringens: *Labium superius* longum rectum, angustum, integrum, marginibus lateralibus inflexis; *Labium inferius* longius, latius, marginibus lateralibus reflexis, parum trifidum: lacinia media longiori, acuminata.

STAM. *Filamenta* duo, inferiori parti faucis inserta, longitudine labii superioris, & sub eo involuta. *Antheræ* coneretæ.

PIST. *Germen* quadrifidum. *Stylus* filiformis, cum staminibus involutus. *Stigma* simplex.

PER.

PER. nullum.

SEM. quatuor, parva, ovata.

*Folia* rugosa, ovata, acuminata, marginibus lateralibus serrata, bina opposita, petiolata.

*Caulis* concavus, quadrangularis, quatuor sulcis oppositis.

*Flores* gerit rubros in *Verticillo* densissimo caulem vel ramulos terminante, cujus *Involucrum* multiplex, ex plurimis toliis lanceolatis constat: eorum autem exteriora longiora, interiora gradatim minora & coloratiora.

Intra verticillum sæpe *Caulis* novus minor nascitur, qui eisdem florum verticillum minus, inferiori simillimum, sustinet.

OBS. *Supra omnes flores* hos *Aviculæ THE HUMMING BIRD* dictæ frequentant, & quamdiu floret, illas quotidie, mane præcipue circumvolitantes videre licet, mel ex floris tubo rostris suis longis exsugentes.

8. COLLINSONIA. *Linn. cliff.* 14. t. 5.

*Nostratibus* Horte-weed.

*CAL.* *Perianthium* monophyllum, tubulatum, quinque-dentatum: quorum tres superiores latiores, reflexi; duo inferiores lineares, recti.

*COR.* Monopetala, tubulata, infundibuliformis, superius compressa, ita ut latus superius & inferius ad se mutuo adpropinquant & fiant latiora, quam duo interposita opposita latera. *Latus superius* desinit in duos dentes: duo utrinque *Lateralia* in dentem unum: *Latus autem inferius* extenditur in laciniam longam, reflexam, & in ramulos lineares divisam.

*STAM.* *Filamenta* duo, setacea, longissima, veluti

L 3

duo

duo cornua utrinque ad latera opposita angustiora extensa. *Antheræ* simplices, distantes.

**PIST.** *Corpora* quatuor, globularia, ad basin styli, germinibus plantarum verticillatarum simillima.

*Germen* autem ad horum latus aliud est corpus globulare, pallidioris coloris. *Stylus* fetaceus, rubens, ad latus inclinatus, apice bifidus.

**PER.** nullum. *Calyx* auctus semen in fundo fovet.

**SEM.** unicum, globosum. Dum *Semen* crescit, corpora illa quatuor embryonum forma ad latus protrudit, & antequam semen maturescat, illa arefcunt.

*Folia* magna, ovata, acuminata, ferrata, bina opposita: pedunculis longis.

*Caulis* sæpius simplex, aliquando autem & brachiatus ramulis ex alis foliorum.

*Flores* gerit in *Spicis* laxis caulis, vel ramulorum terminalibus.

*Radix* perennis, dura, glandulosa, inæqualis, compressa, ad superficiem terræ horizontaliter sita, fibras tenues emittens.

**OBS.** *Planta odorem Melissæ spirat.*

*Radix ad dolores post partum valere dicitur.*

*Solo gaudet nigro & fertili.*

## TRIANDRIA

### MONOGYNIA.

9. **ALSINE** foliis ellipticis succulentis.

**CAL.** *Perianthium* pentaphyllum: foliolis ovato-lanceolatis, persistentibus.

**COR.** *Petala* quinque, calyce minora, ad unguem bifida.

**STAM.** *Filamenta* tria, corolla breviora, inter divaricationes stigmatis assurgentia. *Antheræ* globulares, magnæ, rubentes.

**PIST.**

**PIST.** *Germen* ovatum. *Stylus* brevissimus, *Stigma* trifidum; ramulis horizontaliter reflexis, & inter se angulos æquales perficientibus.

**PER.** *Capsula* conica, unilocularis.

**SEM.** plurima, globularia.

*Folia* bina opposita, obverse elliptica, integra, glabra, succulenta.

*Caulis* repens.

**OBS.** Hæc planta facillime *Stamina* dejicit; sed nunquam plura quam tria observavi.

**IO.** *IRIS* corollis imberbibus, germine trigono.

*Loculi* capsularum interiorum cylindracei, repleti seminibus semiorbicularibus, compressis, ita ut bina juncta forment circulum completum.

**STAMINA** sub *stigmatibus* trifido foliaceo styli recondita.

**OBS.** *Ex situ staminum nihil pulveris antherarum intrare potest per aperturam ullam in stigmate ad divaricationem ejus; verisimile igitur videtur, quod gliscat per exteriorem styli superficiem ad receptaculum seminis; & quod ita fiat in aliis plurimis plantis, v. g. in Zea vel Mays; in quibus superficies styli glabra & lubrica.*

## T E T R A N D R I A M O N O G Y N I A.

**II.** *CEPHALANTHUS* capitulis terminalibus.

*Suffrutex.*

*Perianthium* commune nullum.

**CAL.** intundibuliformis, angulatus; *limbo* quadrifido; plurimi super fundum globulare congesti.

**COR.** *universalis* æqualis perfecte globularis.

*propria* monopetala, tubulata, longa: *limbo* quadrifido.

**STAM.**

STAM. *Filamenta* quatuor, corolla breviora. *Anthere* globosæ.

PIST. *Germen* infra florem. *Stylus* unicus, corolla duplo longior. *Stigma* globulare.

PER. nullum.

SEM. Solitare, pyramidale, ad basin acuminatum, angulatum.

Plurima super fundum globulare villis tectum, dense fira.

*Folia* ovata, glabra, integra, bina opposita, petiolata.

*Caulis* lignosus, glaber.

*Flores* ad extremitates ramulorum in perfectum globum colliguntur.

12. CEPHALANTHUS capitulis pendulis.

Arbore *Nestratibus* Button-wood. *D. Clayton.*

CAL.

COR.

STAM.

PIST.

PER. nullum.

SEM. solitare, longum, pyramidale, ad basin acuminatum, angulatum, lanugine ad cuspidem bateos adhærente.

Plurima super fundum globulare dense compacta.

*Folia* lata angulata.

*Flores & Fructus* ad extremitates ramulorum pedunculis longis dependentes.

13. APARINE vulgaris.

Foliis senis, verticillatis, ovatis, costa media & marginibus hispida, vestibus adhærentibus. *Caulis* quadratus, angulis acutis.

14. PLANTAGO latifolia quinquenervia vulgaris, foliis obverse ellipticis.

15. PLAN-



15. *PLANTAGO angustifolia trinervia.*

OBS. *Has duas plantas, quamvis spontaneas crescentes, puto non indigenas esse, sed ex Europa cum Graminum & Frumentorum seminibus allatas, ut plures aliae; in locis namque cultis & ad vias publicas duntaxat inveniuntur.*

16. *CORNUS involucro maximo: foliis obverse cordatis. Linn. cliff. 38. Gron. virg. 17.*

OBS. *Hæc Arbor non Yser-hout dicitur, sed Carpinus a Belgis Noveboracensibus sic nominatur.*

17. *CORNUS Fæmina D. Clayton. Gron, virg. 17.*

Frutex.

CAL. nullus vel exiguus.

COR. *Petala*, quatuor, cruciformia.

STAM. quatuor. *Antheræ* incumbentes.

PIST. *Germen* globulare. *Stylus* unicus. *Stigma* simplex.

PER. *Drupa* parva, globularis, umbilicata; pulpa molli, aquea, primo viridis, postea pallida, postremo cærulea.

SEM. *Nux* globularis.

*Folia* bina opposita, ovata, acuminata, integra: costa media a petiolo ad apicem extensa, & ramulos laterales opposite emittente.

*Flores* in racemis erectis ad extremitates ramulorum.

DIGYNIA.

18. *HAMAMELIS. Gron. virg. 139.*

*Nostratibus* Witch-Hazel. Frutex.

CAL. *Involucrum* commune trium florum; folia tria, circularia, concava, externe hirsuta.

*Perianthium* proprium tetraphyllum; foliolis ovato-acuminatis, æqualibus; persistens.

M

COR.

COR. *Petala* quatuor, linearia, longissima, æqualia.  
*Nectaria* quatuor foliolis truncatis, ad unguis  
 petalorum singulis, vix nudis oculis distinguendis.

STAM.

PIST. *Germen* villosum, desinens in stylos duos conicos. *Stigmata* simplicia.

PER. *Nux* globularis, in superiori parte duobus sulcis cruciatim, & in quatuor cuspidibus obtusis fecta, bilocularis, bifariam dehiscens.

SEM. *Nucleus* solitarius, ovato-oblongus, glaber, nitidus, in unaquaque cellula unus.

*Folia* alternata, ovata, crenata, petiolata, fibra longitudinali ramulos laterales utrinque alternatim emittente.

*Surculi & Stolones Coryli* simillimi.

*Flores* terni ex uno pedunculo, sed duo tantum fructum plerumque producant ad maturitatem.

OBS. *Hic Frutex mense octobri, post occasum foliorum, tota floribus tegitur; Fructus autem non ad maturitatem proveniunt, nisi sequenti æstate.*

## P E N T A N D R I A

### MONOGYNIA.

19. LITHOSPERMUM arvense, radice rubente. *Bauh. pin.* 258.

OBS. *Hanc plantam solummodo inter Segetes crescentem observari; puto igitur ex Europa inter Frumentorum semina advectam.*

20. DIERVILLA foliis axillaribus. *Linn.* (*Lonicera octava* forte *Hort. cliff.* 497).

CAL. *Folia* quinque, longa, linearia.

COR. Monopetala. *Tubus* calyce longior: *limbo* in quinque laciniis diviso.

STAM.

STAM. quinque. *Antheræ erectæ.*

PIST. *Germen pyramidale infra receptaculum floris. Stylus unicus staminibus longior. Stigma globulare.*

PER. *Capsula oblonga, ad basin crassior, versus apicem teres, calyce coronata, locularis.*

SEM. plurima, globularia.

*Folia ovata acuminata, leviter crenata, bina opposita, pinnatarum more sita, petiolis brevibus.*

*Flores ex alis foliorum pedunculis longis.*

21. DIERVILLA. *Linn. cliff. 63. t. 7.*

*Fructificationis partes omnes, ut a LINNÆO descriptæ.*

*Folia bina opposita, ovato-oblonga acuminata, leviter ferrata, petiolata, petiolis brevissimis.*

*Flores ad extremitates ramulorum in racemis & alis foliorum.*

OBS. *Tota facie a Loniceris differt.*

22. LYSIMACHIA foliis lanceolatis, floribus solitariis.

*Linn. cliff. 52. Gron. virg. 20.*

*Fructificationis partes omnes, ut a LINNÆO descriptæ.*

*Caulis altus, brachiatus.*

*Folia lanceolata, petiolata, integra, bina opposita.*

*Flores singuli ex alis foliorum, pedunculis longis, sed sæpe flores verticillatim positi.*

23. CAMPANULA caule simplicissimo, foliis amplexicaulibus. *Linn. cliff. 65. Gron. virg. 22.*

CAL. *Folia quinque, lanceolata.*

COR. *Monopetala, quinquefida: laciniis ovatis, acuminatis.*

STAM. quinque, brevia.

M 2

PIST.

- PIST.** *Germen* infra receptaculum floris. *Stylus* unicus, staminibus longior. *Stigma* trifidum.
- PER.** *Capsula* cylindræa, calyce coronata, bilocularis.
- SEM.** plurima, minima, alba.
- Folia* alterna, cordata, crenata, amplexicaulia.
- Flores* ex alis foliorum.
- Majo & Junio* floret.
24. **AZALEA** ramis infra flores foliosis. *Gron. virg. 21.*  
*Nostratibus* Honey-Suckle. *Belgis Nov-Eboracensibus.* Pinxter-bloem. Frutex.
- CAL.** *Perianthium* minimum, quinquedentatum, hirsutum, persistens.
- COR** *Petalum* unicum. *Tubus* longus, infundibuliformis, hirsutus. *Limbus* quinquepartitus, expansus: laciniis æqualibus, reflexis, quarum una profundius separata.
- STAM** *Filamenta* quinque, corolla longiora, versus apicem arcuata, floris receptaculo inserta. *Antheræ* parvæ, oblongæ.
- PIST.** *Germen* cylindræum, villosum, supra receptaculum floris. *Stylus* unicus, staminibus longior, arcuatus. *Stigma* obtusum, capitatum.
- PER.** *Capsula* cylindræa, quinquelocularis, quinquevalvularis, ab apice longitudinaliter dehiscens; *Placenta* longa, cui *Stylus* ad maturitatem usque adhæret.
- SEM.** plurima furfuræa.
- Caulis* erectus, ramosus.
- Folia* ovata, integra, alterna, fibra media longitudinali, ad petiolum angustiora.
- Flos* albus, glutinosus, non pilosus. *Flores* in corymbo ad extremitates ramulorum.

25. AZALEA erecta, foliis ovatis integris alternis, flore luteo piloso præcoci.

26. LONICERA feu Periclymenum scandens, foliis amplexicaulibus.

27. ANONYMA calyce duplici.

CAL. *Perianthium* duplex, persistens. *Exterius* ex duobus foliis concavis, ovatis. *Interiorius* cylindraceum: laciniis quinque inæqualibus, acuminatis.

COR. *Petalum* unicum, magnum, infundibuliforme, plicatum, *limbo* quinquangulari.

STAM. quinque, erecta, corollæ inserta. *Anthera* erectæ

PIST. *Germen* globulare. *Stylus* unicus, staminibus longior. *Stigma* ovale, bifidum.

PER. *Capsula* globularis.

SEM.

*Caulis* repens, brevis.

*Folia* alterna, ovata, mollia.

*Flores* ex alis foliorum singuli seu solitarii.

28. CLAYTONIA foliis linearibus. *Linn.* Claytonia: *Gron. virg.* 25.

Hæc species in omnibus cum descriptione Gronovii in Flora virginica convenit, præterquam, quod *Folia* duo linearia succulenta opposita ad exortum racemi, & quod apex *Styli* sit trifidus.

*Nervus* tenuis, vel filum tenax, coloris carnei in medio caulis & facile ab eo separabilis, a radice ad apicem usque racemi percurrit.

*Aprili* floret in humidis.

29. MIRABILIS. *Linn. cliff.* 53.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquefidum: laciniis lanceolatis.

M 3

COR.

- COR. *Petalum* infundibuliforme, situm super Ger-  
men.
- Nectarium* nullum observare potui.
- STAM. quinque, basi corollæ inserta.
- PIST. *Germen* globulare, calyce inclusum, super  
quod corolla locatur, *Stylus* unicus filiformis.  
*Stigma* simplex.
- PER. nullum.
- SEM. unicum ovatum.
- OBS. *Sole splendente corolla clauditur, nocte autem  
& primo mane expanditur, & 12. horas in vi-  
gore perdurat; sed est perpetua successio novorum  
florum.*  
*Indigena non est; nam in hortis colitur.*
30. VERBASCUM pusillum, foliis lanceolatis glabris.  
CAL. *Perianthium* foliis quinque, lanceolatis.
- COR. *Petalum* rotatum. *Tubus* cylindraceus brevis-  
simus. *Limbus* patens, quinquepartitus: laci-  
niis plusquam semicircularibus: duæ superiores  
minores, inferiores majores.
- STAM. quinque, versus superiorem corollæ partem  
inclinata, lanugine obducta, corollæ inserta,  
duo inferiora longiora.
- PIST. *Germen* globulare. *Stylus* unicus subulatus,  
staminibus longior. *Stigma* simplex.
- PER. *Capsula* bilocularis, globularis.
- SEM. plurima.
- Herba* pusilla est.  
*Folia* alterna, sessilia, lanceolata, glabra.  
*Flores* pedunculati, solitarii, ex alis foliorum.
31. VERBASCUM mas latifolium, luteum. *Bauh. pin.* 239.  
*Stamina* non sunt inclinata, duo longiora nuda, tria  
breviora lanugine tecta.

*Folia* alternā lanugine tecta, mollia, sessilia.

Hæc præalta est, flores gerens sessiles, in spica longissima caulis terminatrice, quare hæc duæ facie diversissima.

32. SOLANUM radice esculenta.

Irish Potato.

CAL. *Perianthium* monophyllum, persistens: laciniis quinque lanceolatis.

COR. *Petalum* unicum. *Tubus* brevissimus. *Limbus* patens fere planus, quinque-angularis, sole non ardente plicatus.

STAM. *Filamenta* quinque brevissima. *Antheræ* longæ, fulcatæ, conniventes, contingentes.

PIST. *Germen* ovale. *Stylus* unicus, staminibus longior. *Stigma* simplex.

PER. *Bacca* magna, globularis.

SEM.

OBS. *Colitur in agris & hortis.*

33. PHYSALIS foliis ovatis, floribus singulis ex foliorum alis, vesica fructum includente pentagona, versus pedunculum exterius concava.

34. CEANOTHUS foliis trinerviis. *Linn.* Celastrus inermis, foliis ovatis serratis trinerviis racemis exsummis alis longissimis. *Hort. cliff.* 73. *Gron. virg.* 25.

*Nostratibus* Red-root. Frutex. *Clayt. n:o* 69.

& 311.

CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum, femiquinque-fidum, coloratum, album; laciniis omnibus inflexis.

COR. *Petala* quinque, per incisuras calycis exeuntia, tubulata, inferius angusta, superius ampliora.

STAM.

STAM. *Filamenta* quinque. *Anthera* globosæ.  
 PIST. *Germen* - - - *Stylus* unicus. *Stigma* trifidum.  
 PER. *Capsula* triquetra vel trigona, protuberantiâ,  
 vel lobo ovali ad singulos angulos auetâ, supe-  
 rius obtusa, trilocularis.  
 SEM. unicum in singulo loco.  
*Caulis* perennis, ramosus.  
*Folia* alterna, ovata, crenata vel tenuiter ferrata.  
 Fibræ tres ex apice petioli ortæ, quarum me-  
 dia ad apicem folii extenditur, ramulos latera-  
 les emittunt.  
*Flores* gerit in racemis ita exiguos, ut eorum par-  
 tes vix, nisi oculis armatis, distingui possint.

35. VITIS foliis quinatis, foliolis ovatis ferratis. *Linu.*  
*cliff.* 74. *Gron. virg.* 24.  
*Hedera* quinquefolia *Cornuti*.  
 CAL. *Perianthium* campanulatum, parvum, limbo  
 quinquepartitum.  
 COR. *Petala* quinque, ovata.  
 STAM. *Filamenta* quinque, brevissima. *Anthera*  
 magnæ, erectæ.  
 PIST. *Germen* pyriforme. *Stylus* nullus. *Stigma*  
 simplex.  
 PER. *Bacca* exsucca, globularis, unilocularis, con-  
 tinens  
 SEM. *Semina* tria vel quatuor, totidem segmenta  
 spheræ per axin sectæ simillima.  
*Caulis* scandens ramosissimus.  
*Folia* quinata, petiolis longis insistentia, sparsim den-  
 tibus raris ferrata.  
*Stamina & Anthera*, nisi flore nondum expanso, vix  
 distinguendæ.



36. RIBES fructu albo & Ribes fructu nigro.  
 CAL. nullus, nisi Corolla sit.  
 COR. *Petalum* unicum, semiquinquefidum: laciniis latis, ovatis.  
 STAM. *Filamenta* quinque, brevia, *Anthera* incumbentes.  
 PIST. *Germen* infra receptaculum floris. *Stylus* unicus. *Stigmata* duo, recurvata.  
 PER. *Bacca*,  
 SEM.  
*Flores & Fructus* in racemis.  
*In hortis colitur.*
37. RIBES sylvestris, fructu nigro.  
 CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquefidum, laciniis reflexis.  
 COR. *Petala* quinque, calyci inserta, erecta, Cetera ut in *Ribe*.  
*In humidis crescit.*
38. RIBES quod Grossularia fructu albo.  
 CAL. *Perianthium* monophyllum quinquefidum; laciniis reflexis.  
 COR. *Petala* quinque, calyci inserta, erecta.  
 STAM. quinque corollâ longiora. *Anthera* erectæ, ovata.  
 PIST. *Germen* infra receptaculum floris. *Styli* duo paralleli recti. *Stigmata* simplicia.  
 PER. *Bacca*.  
 SEM.  
*Flores* singuli pedunculis propriis.  
*In hortis colitur.*
39. RIBES quod Grossularia sylvestris, fructu rubro.  
*In aquosis crescit.*

## DIGYNIA.

40. ASCLEPIAS foliis binis ovatis; subtus incanis, floribus in umbella erecta purpureis.  
*Florum Nectaria* exterius acuminata in formam auriculæ Felis.  
*Caulis* erectus.
41. ASCLEPIAS caule erecto simplici annuo; foliis ovato-oblongis binis oppositis subtus incanis; umbella nutante, florum nectariis ovatis.
42. ASCLEPIAS caule erecto annuo, foliis ovatis acuminatis alternis. (*Gron. virg. 27.*)  
*Flores* aurantii. *Foliola* plura lanceolata ad modum involucri umbellularum ad centrum umbellæ.  
*Nectaria florum* acuminata.
43. ASCLEPIAS caule erecto, foliis ovato-lanceolatis octo, quorum bina infima & suprema opposita, quatuor autem media cruciatim opposita, floribus in umbella erecta.
44. ASCLEPIAS caule erecto foliis lanceolatis umbella terminatrici erecta.  
*Aquatica est.*
45. APOCYNUM caule ramoso rubente, floribus suavolentibus in racemis ad extremitates ramulorum dependentibus ex alis foliorum.  
*Folia* ex adverso bina, pinnatarum more posita.  
*Fructus Folliculi* duo, longi, teretes, rubentes.
46. APOCYNUM (foliis ovatis acutis subtus tomentosis. *Gron. virg. 28.*)  
*Nostratibus* Indian-Hemp.  
*Folia* ovata, integra, glabra, petiolata, bina opposita, quorum unum par (aliter quam in priore )  
ad

ad angulos rectos pari superiori & inferiore in caule & ramos crescit.

*Flores* parvi, campanulati, quinquefidi, laciniis vel erectis vel inflexis, crescuntque in umbellis irregularibus, ramulorum terminatricibus: Ramulis ex alis foliorum. Flores omnes, quos hoc anno observavi, abortierunt.

47. ULMUS americana.

CAL. *Perianthium* monophyllum, infundibuliforme, ad unum latus magis extensum; limbo irregulariter diviso.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* septem calyce longiora. *Anthere* incumbentes irregulares.

PIST. *Germen* ita exiguum, ut non distingui possit. *Styli* duo, lati, reflexi.

PER.

SEM.

*Flores* primo vere folia antevertunt, parvi & in racemos pedunculis parvis crescunt.

48. ANONYMA Mitellæ affinis.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum: foliolis, obtusis, supra germen sitis. (serta.

COR. *Petala* quinque, minima, inter calycis folia in-

STAM. quinque inæqualis longitudinis. *Anthere* globosæ.

PIST. *Germen* infra receptaculum floris. *Styli* duo reflexi. *Stigmata* simplicia.

PER. *Capsula* conica, unilocularis, a superiori parte calyce cincta, ac stylis duobus persistentibus in apice ejus.

SEM. plurima, minima.

*Caulis* nudus sustinens flores in spica laxa caulister-

minatrici, composita ex floribus in racemis parvis pedunculo longo sustentatis.

*Folia* radicalia, cordata, obsolete lobata, pilosa, crenata.  
*Floret* Majo.

49. GENTIANA autumnalis prima.

CAL. *Perianthium* infundibuliforme, persistens: limbo in quinque lacinias ovatas, reflexas diviso.

COR. *Petalum* unicum, tubulatum, ventricosum, ore arcte plicato, crenato.

STAM. quinque corollæ inserta. *Anthera* erectæ.

PIST. *Germen* cylindricum longum, sursum deorsumque angustius. *Stylus* nullus. *Stigma* bifidum: laciniis reflexis.

PER. *Capsula* ovata parum compressa, corolla marcescente tecta, unilocularis.

SEM. plurima parva ovato-compressa, membranacea.

*Folia* obverse elliptica, acuminata, sessilia, integra, glabra, fibra media unica longitudinali, bina opposita.

50. GENTIANA autumnalis secunda.

CAL. *Perianthium* quadrangulare in quatuor lacinias acuminatas divisum, duæ oppositæ angustiores.

COR. *Petalum* unicum tubulatum; limbo in quatuor lacinias ciliatas ovatas diviso.

STAM. quatuor corollæ inserta. *Anthera* incumbentes.

PIST. *Germen* cylindricum, longum, ventricosum, compressum. *Stylus* nullus. *Stigmata* duo ovata, reflexa.

PER. *Capsula* oblonga, ovata, compressa, unilocularis.

SEM. plurima, parva, globularia.

*Folia* bina opposita sessilia, integra, lanceolata, fibra unica longitudinali. *Flores*

*Flores* Pedunculis longis ex alis foliorum vel caulibus terminatricibus.

*Florum* apices, antequam expanduntur, spiraliter contorti.

51. GENTIANA autumnalis tertia.

CAL. *Perianthium* in quinque lacinias inæquales lanceolatas divisum, persistens.

COR. *Petalum* unicum tubulatum ventricosum acuminatum: *Limbo* in quinque lacinias ovato-acuminatas; ad basin ampliatas, conniventes diviso.

STAM. quinque.

PIST. *Germe*n cylindricum. *Stigmata* duo reflexa.

PER. *Capsula* cylindrica, corolla marcida inclusa.

SEM. plurima, arida.

*Folia* sessilia, lanceolata, trinervia vel quinquenervia, bina opposita.

*Flores* pedunculis sæpe foliosis, ex alis foliorum.

52 PANAX, foliis ternis ternatis. *Gron. virg.* 35. 147.

CAL. *Umbella* simplex, æqualis, conferta: radiis æqualibus.

*Involucrum* foliolis octo, lanceolatis.

*Perianthium proprium* coloratum, monophyllum, campanulatum: ore quinquefidum: laciniis obtusis.

COR. *Universalis* uniformis; *Propria* petalis quinque, calycis incisuris insertis.

STAM. *Filamenta* quinque, calyci inserta. *Anthere* didymæ.

PIST. *Styli* tres erecti. *Stigmata* simplicia.

*Fructum nunquam vidi.*

*Folia* terna ternata, utrinque acuminata crenata, ad summitatem caulis, aliquando quinata. Ad divaricationem foliorum surgit pedunculus sustinens florum umbellam.

*Aprili floret. Crescit in madidis.*

*Radix* fibrosa simplex, colore alba.

*Flores* minutissimi; *Planta* pusilla.

53. SANICULA foliis radicalibus compositis, foliolis ovatis. *Gron. virg.* 146.

*Nostratibus* Black-Snake-root.

*CAL. Umbella Universalis* radii quatuor: tres exteriores longiores, quarta in medio brevior:

*Partialis* hæmisphæra, radiis paucis confertis brevibus, omnibus ejusdem longitudinis. *Involucrum* nullum.

*Perianthium* proprium minimum quinquefidum: laciniis lanceolatis.

*COR. Universalis* uniformis. *Partialis* petalis quinque, inflexis, minimis.

*STAM. Filamenta* quinque, corolla duplo longiora, per divisionem petalorum transeuntia. *Antheræ* incumbentes.

*PIST. Germen.* *Styli* duo longitudine staminum reflexi.

*PER.* nullum. *Fructus* globularis, echinatus, per medium dehiscens.

*SEM.* duo, hæmisphærica, hinc convexa echinata, inde plana.

*Folia* ternata, aliquando quinata, ferrata, semel vel bis laciniata.

*Radix* fibrosa, nigra, sudorifera.

54. SIUM americanum.

*CAL. Umbella Universalis* plana: *Partialis* itidem: Radii striati, externi internis longiores.

*Involucrum* duplex, *universale* & *partiale*, ambo ex foliis pluribus lanceolatis, radiis brevioribus.

*Perianthium* proprium vix distinguendum.

*COR.*

COR. *Universalis* uniformis, *propria* ita exigua, ut partes nudis oculis vix distinguendæ.

*Fructus* sphaeroideus, striatus, bipartibilis.

*Caulis* striatus, concavus.

*Folia* pinnata, lanceolata, tenuiter ferrata, quorum unum mediam costam terminat.

*Crescit in aquosis.*

55. SCANDIX feminibus nitidis ovato-subulatis. *Linm. cliff. III. Gron. virg. 32.*

*Umbella universalis* ex tribus radiis longioribus.

*Partialis* ex pluribus.

*Involucrum universale* ex paucis foliolis lanceolatis.

*Partiale* ex foliolis similibus minimis.

*Petiolus* foliorum trifariam dividitur, & unusquisque Petioli ramulus gerit folium pinnatarum more divisum, impari costam terminans ac laciniis subdivisum.

56. APIUM folio infimo cordato, caulinis ternatis; omnibus crenatis.

*Involucrum* nullum.

*Flores* lutei.

*Fructus* ovatus, compressus, striatus,

*Semina* duo, ovata, striata.

### TRIGYNIA.

57. OPULUS (quod Viburnum foliis subrotundis serratis glabris. *Gron. virg. 33?*)

*Frutex.*

CAL. *Perianthium* minimum, ore quinque d'ntat m

COR. *Monopetala* rotata, in quinque laciniis ovales divisa.

STAM. *Filamenta* quinque, corollæ inserta, & calongiora. *Antheræ* incumbentes.

PIST

PIST. *Germen* calyci inclusum, conicum. *Stylus* nullus.

PER. nullum.

SEM. *Nux* parva, globularis, tecta, cortice molli continens *Nucleum* globularem.

*Caulis* brachiatus.

*Folia* petiolata, bina opposita, ovata, acuminata, tenuiter ferrata.

*Flores* gerit in corymbis vel racemis umbellatis ramulorum terminatricibus.

58. OPULUS. *Linn. cliff.* 109. *Gron. virg.* 149.

In omnibus fructificationis partibus convenit priori, nisi quod

*Semen* sit nucleus compressus, cortice duriori tectus.

*Folia* tricuspidata, media cuspidate longiore; in ceteris priori convenit.

59. OPULUS quæ *Tinus* foliis ovatis in petiolos terminatis integerrimis. *Gron. virg.* 33.

*Semina* globularia, nuces minimæ cortice & molli tectæ.

*Folia* ovata nervosa integerrima, in ceteris prioribus convenit.

*Majo* floret.

60. ANONYMA foliis ternatis.

CAL. *Perianthium* minimum, cylindricum.

COR. *Petala* quinque, ovalia, inflexa, minima.

STAM. *Filamenta* quinque, per divisiones petalorum exeuntia. *Antheræ* magnæ.

PIST. *Germen* longum. *Stylus* non distinguendus.

PER. *Capsula* cylindrico-acuminata, calice fere tecta.

SEM.

*Caulis* simplex, foliis paucis.

*Folia*



*Folia* alterna, petiolata, ternata, ovalia, acuminata, irregulariter ferrata, lacinia una aut altera majori.  
*Flores* albi in racemis laxis, vel pedunculo longo ex foliorum alis vel caulis terminatrici.

61. **SAMBUCUS** caule perenni, parum ramoſo, baccis in umbella nigris.

*Stylus* nullus & *Stigmata* oculis nudis non diſtinguenda.

*Sambucus* in hac regione multo humilior, quam in Britannia.

62. **STAPHYLEA** foliis ternatis. *Hort. cliff.* 112.

*Staphylodendron* triphyllum, valculo tripartito. *Clayt. in Gron. virg.*

*Noſtratibus* Bladder - nut.

**CAL.** quinquefidus, perſiſtens.

**COR.** *Petala* quinque, obtuſa.

**STAM.** *Filamenta* quinque, ſubulata. *Antheræ* ovales, incumbentes.

**PIST.** *Germen* pyramidale, lanuginofum. *Stylus* ſubulatus, longitudine ſtaminum. *Stigma* patens.

**PER.** *Veficu* magna, inflata, trigona, tricufpidata, trilocularis, dependens.

**SEM.** unicum in ſingulo loculo, ovatum, glabrum, nitidum.

*Folia* ternata, ovata, acuminata, tenuiter ferrata.

*Flores* racemofi, pedunculis ex alis foliorum.

63. **RHUS** foliis pinnatis ferratis. *Linn. cliff.* 110. *Gron. virg.* 148.

Omnes partes fructificationis ut a LINNÆO deſcriptæ.

*Stamina* vix oculis diſtinguenda, annulo rubenti in fundo corollæ innixa.

*Caulis* erectus.

O

*Folia*

*Folia* pinnata, ferrata, impari costam terminante.  
*Succus lacteus.*  
*Junio floret.*

64. RHUS foliis pinnatis integerrimis. *Linn. cliff.* 110.

*Gron. virg.* 148.

Fructificationis partes ut a LINNÆO descriptæ, præterquam quod *Stamina* Petalis sunt longiora.  
*Antheræ* magnæ, fulcatæ, incumbentes.

*Flores* ita exigui, ut *Styli stigmata* observare non potui.

*Caulis* medullosus, erectus.

*Folia* pinnata, integra.

*Flores* in racemis ex foliorum alis dependent.

OBS. Vapores & Perspiratio acres ex hoc Frutice exhalant, ut plurimis appropinquare illum non liceat, quin pustulas acres, dolores & tumores erysipelatos pariant, alii autem, inter quos ego, impune illam pertractant.

65. RHUS late scandens, foliis ternatis.

Toxicodendron.

*Folia* tria, integra, ex uno petiolo longo.

#### PENTAGYNIA.

66. ARALIA caule aphylo, radice repente.

*Aralia* caule nudo. *Linn. cliff.* 113. *Gron. virg.* 34.

*Nostratibus* Sarfa - parilla.

CAL. *Involucrum* nullum. *Perianthium* quinquedentatum.

COR. *Petala* quinque, lanceolata, totaliter reflexa, calyci inserta.

STAM. *Filamenta* quinque, fundo calycis inserta.  
*Antheræ* incumbentes.

PIST. . . . *Styli* quinque, persistentes. *Stigmata* simplicia.

PER.

PER. *Bacca* globularis, striata, quinque sulcis notata, coronata stylis in apice remanentibus, quinquelocularis.

SEM. Solitarium in unoquoque loculo, semicirculare, durum.

*Caules* duo ab extremitate radice emittuntur (quoties florescit, alias unus solus) uterque dichotomus. Unus absolute aphyllus, tres globos florum sustinet. Alter tria folia quinata, aliquando duo folia quinata & unum ternatum, vel unum simplex.

*Radix* longissime repit sub superficie terræ, fibra lignosa, cortice carnosio tecta. Odore & gustu balsamico. Ab incolis frequenter usurpatur pro *Sarsaparilla*, & in omnibus, quibus vulgo *Sarsaparilla* usurpatur, efficacior est (ut sæpius expertus sum) morbis. Corticem radice contusum Indigenæ ad vulnera applicant.

67. ARALIA caule folioso lævi.

*Aralia* ex alis florifera. *Hort. cliff.* 113.

*Nostratibus* Spicknard.

*Folia* cordata, bina opposita, pinnatarum more fita, foliorum etenim plana ramulis vel mediæ costæ parallela sunt, & eorum unum ramulum terminat.

*Flores* gerit, non in umbella, sed in racemo composito, uvarum instar.

*Radix* tuberosa, crassa, succo lacteo balsamico, grato, odoris abundans.

In *Morbis stomachi & pectoris* frequentius a nostratibus usurpatur.

68. ARALIA arborea aculeata. *Linn. virid.* 26. *Gron. virg.* 34.

*Nostratibus* Prickly-Ash, vel Toolh-ach tree.  
Frutex.

CAL. *Perianthium* hexaphyllum, foliolis ovalibus,  
margine coloratis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* sex. *Antherae* didymæ, sulcatæ,  
magnæ.

PIST. *Germina* quatuor, ad basin pedunculo unita.  
*Styli* totidem, ex lateribus prodeuntes, & versus  
centrum floris versi. *Stigmata* obtusa.

PER. } abortierunt.  
SEM. }

*Caulis* & *Ramuli* aculeis compressis, triangularibus,  
acutis armati.

*Folia* pinnata, impari costam terminante. Pinnulæ  
ovales petiolo brevi costæ adhærentes.

*Flores* parvi, herbacei, fere sessiles, pedunculis  
brevissimis super superficiem ramulorum in acer-  
vis sparsi crescunt, & folia anteverunt.

OBS. Numerus staminum incertus, in quibusdam  
floribus ejusdem plantæ septem, in pluribus so-  
lummodo quinque, sed in plerisque sex obser-  
vavi. Nec numerus germinum certus; in aliqui-  
bus duo, in pluribus tria, sed in plurimis qua-  
tuor. In aliquibus etiam septem folia Perianthii.

*Cortex* hujus gustu fervidus & Decoctum ejus ab In-  
digenis ad Hydropem & Morbos Rheumaticos u-  
surpatur, & eorum exemplo ab Incolis, est insigne  
sudoriferum.

## HEXANDRIA MONOGYNIA.

69. PONTEDERIA floribus spicatis. *Hort. cliff.* 133.  
*Gron. virg.* 37.

CAL.

CAL. *Spatha* communis.

COR. Monopetala, tubulata (non ringens). *Labium superius* in tres lacinias minus profunde fectum, & earum media duabus maculis luteis notata. *Labium inferius* in tres angustiores lacinias fectum.

STAM. *Filamenta* sex, quorum tria longiora, subulata ori tubi inserta, tria breviora basi ejusdem.

PIST. *Germen* ovale, supra receptaculum. *Stylus* unicus longitudine tubi.

PER. *Capsula* conica, sulcata, apice lato, inflexo.

SEM. plura.

*Folia* sagittata.

*Flores* carulei in spica caulis terminatrice.

*Crescit in aquosis & floret Augusto.*

70. LILIUM f. Martagon. *Clayt.*

CAL. nullus.

COR. campanulata. *Petala* sex, erecta, dorso obtuse carinata, unguibus longis: tribus alternis fibra longitudinali carinata; aliis unguibus cavis, marginibus intus inflexis. *Bractea* obverse elliptica; apicibus reflexis: interius purpureis maculis notata.

STAM. *Filamenta* sex, subulata, stylum prementia. *Antherae* erectae, sed ad medietatem filamentis adnexa.

PIST. *Germen* oblongum cylindricum, sex, sulcis: tribus magis notabiliter striatum. *Stylus* simplex. *Stigma* obtusum.

PER. *Capsula* oblonga, trigona, angulis sulcatis, trilocularis.

SEM. Plurima compressa, ovata, duplici ordine collocata.

*Caulis* simplex, unico plerumque flore (aliquando pluribus) ad summam erecto.

*Folia* longa, angusta, sessilia, verticillatim ad caulem posita, quinque vel sex in unoquoque verticillo.

71. LILIUM alterum.

Lilium Martagon floribus pluribus ad summam caulis, pedunculis longis reflexis pendulis.

*Petala* hujus sunt obverse elliptica, usque ad basin, ita ut fundus corollæ sit clausus, qui in prioribus inter unguis petalorum pervius est.

In ceteris priori convenit.

72. ERYTHRONIUM foliis ovato-oblongis glabris nigro-maculatis. *Gron. virg.* 151.

*Caulis* vel *Scapus* simplex, sustinens florem unicum. *Gron. virg.*

73. UVULARIA foliis sessilibus, flore unico.

CAL. nullus.

COR. *Petala* sex oblonga, lanceolata.

STAM. *Filamenta* sex, brevissima. *Antheræ* erectæ, filamentis longiores.

PIST. *Germen* triquetrum. *Stylus* staminibus longior, semitrididus.

PER. *Capsula* trigona, utrinque acuminata, ex tribus planis - - - formata trilocularis.

SEM.

*Flos* unicus ex ala folii, pedunculo dependens.

74. UVULARIA caule perfoliato. *Gron. virg.* 37.

Polygonatum ramosum, flore sulco majus. *Morif. hist.* 3. p. 538. f. 13. t. 4. f. 12. optime.

In omnibus floris partibus cum priori convenit.

*Capsula* versus pedunculum acuminata, ad basin obtusa, ex quatuor quasi planis triangularibus con-

con-

constans, quorum tria ad apicem unita sulco cavantur, vel *Capsula* dici potest pyramidalis triangularis, apice ad pedunculum, lateribus tribus sulcis excavatis, trilocularis.

**OBS.** *Radix cum aqua contusa & ad vulnus morsus Serpentis caudilonæ applicata, in usu est apud Nostrates.*

75. **LEONTICE** foliis supra decompositis. *Gron.virg.151.*  
Christophoriana baccifera.

**CAL.** *Perianthium* hexaphyllum; foliolis longis, acutis, deciduis.

**COR.** *Petala* sex, minima, herbacei coloris, deficientia ad basin in ungues brevissimos, limbo patentia, ut simul juncta circulum efforment.

*Fortasse hæc revera non sunt petala sed nectarìa.*

**STAM.** *Filamenta* sex brevissima. *Antheræ* erectæ, ovatæ, sulcatæ.

**PIST.** *Germe*n supra receptaculum floris ovatum, *Stylus* unicus brevis, ad latus germinis affixus. *Stigma* simplex.

**PER.** *Bacca* cærulea, globularis, ad tactum mollis, sed postquam maturefcit intus sicca.

**SEM.** unicum, magnum, globulare.

*Caulis* surgit supra altitudinem pedalem simplex & nudus, ubi dividitur in ramulos plerumque quatuor vel quinque, qui subdividuntur in petiolos plerumque tres, sustinentes folia terna tricuspidata: duo sc. opposita, & unum petiolum terminans, glabra, *Thalictri* foliis similia.

*Flores* in racemis erectis pedunculo ex ala ramulorum.

*Aprili* floret. *Fructus* Septembri maturefcit.

76. **ORNITHOGALUM** luteum minimum, foliis angustis.

77. **CON-**

77. CONVALLARIA floribus herbacei coloris: duobus vel tribus eodem pedunculo ex alis foliorum dependentibus.

78. CONVALLARIA floribus alternis, racemo terminali.  
*Linn. cliff. 125. Gron. virg.*

### TRIGYNIA.

79. VERATRUM.

CAL. *Folia* sex, lanceolata, persistencia.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* sex. *Antheræ* globosæ.

PIST. *Germen* conicum, striatum. *Stylus* nullus.  
*Stigmata* tria, reflexa.

PER. *Capsula* trilocularis trigona ovata, tribus sulcis excavata, ex tribus capsulis longitudinaliter unitis constans.

SEM. plurima, compressa, femiovata.

*Folia* alternata, sessilia, elliptica, longitudinaliter plicata.

*Flores* in spicis ramosis.

*Radix* emittens fibras plurimas albas.

*Flores* omnes sunt revera hermaphroditi, sed cum successive explicantur, Planta mense Junio arctit, antequam fructus in superioribus floribus ad perfectionem pervenire possunt.

*Masculos flores (ut observat LINNÆUS) esse infra femininos mihi videtur non naturale, & certe nil tale in hac specie.*

*Crescit in aquosis, caloris & siccitatis impatiens.*

80. VERATRUM caule simplicissimo, spica ante florentiam incurvata.

*Nostratibus Unicorn's horn.*

CAL.



CAL. *Folia* sex, minima, linearia, colorata, a staminibus non facile distinguenda, persistentia.

COR. nulla, si non Calyx pro ea sumatur.

STAM. sex, inæqualis longitudinis. *Anthera* parvæ.

PIST. Nec *Germen*, nec *Stylus*, nec *Stigma* distinguere possunt, nisi quod prominentia quædam minima in centro floris appareat. Postquam autem stamina aruerint, *Germen* auctum sit, *Stigmata* foliacea minima alba reflexa manifeste apparent.

PER. *Capsula* ovalis, tribus sulcis longitudinaliter excavata, trilocularis, apice dehiscens.

SEM. plurima, compressa, furfuracea.

*Folia* oblonga, acuminata, integra, alternata, liliacea.

*Caulis* simplex.

*Flores* albi crescunt in spica longa caulis terminatrici dense siti; pedunculis brevibus albis; *Spica* primo intuitu tota staminibus tecta videtur.

Tota *spica* dum florescit, alba videtur, & in summitate recurvata est, postquam autem germina impregnata sunt, crassescit, fit erecta & herbacei coloris, ut etiam foliola Perianthii fiunt herbacei coloris.

*Radix* succifa, emittens fibras laterales.

*Radix* in usu est apud nostrates ad Colicam.

81. PARIS foliis ternis, flore pedunculato nutante.

CAL. *Perianthium* triphyllum: foliolis lanceolatis, acutis, corollæ circiter magnitudine, patentibus.

COR. *Petala* tria, lanceolata, patentia.

STAM. *Filamenta* sex, brevia. *Anthera* longiores erectæ.

PIST. *Germen* pyramidale, sex sulcis a staminibus effectis a basi ad apicem excavatum, *Stigmata* reflexa.

P

PER.

PER.

SEM.

*Caulis* gerit tria tantum folia opposita, sessilia, ovato-acuminata, integra, glabra, ex quorum medio flos rubro-purpureus pedunculo dependet.

*Si nulle in hac regione species sint staminibus octo, rectius, me iudice, ad hanc classem refertur in Flora hujus regionis Genus hoc.*

*Indigenæ hanc plantam noxiam & venenatam esse mihi indicarunt.*

82. RUMEX calycis foliis interioribus ad basin dentatis.

CAL. *Perianthium* hexaphyllum, persistens: foliis tribus exterioribus lanceolatis, reflexis; totidem interioribus conniventibus, ad basin utrinque dentatis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* sex, capillaria, brevia. *Antheræ* erectæ magnæ cylindricæ, didymæ.

PIST. *Germen* triquetrum, seu pyramis triangularis, ex cujus apice surgit *Stylus*, qui statim dividitur in tres ramulos reflexos, per rimas foliorum calycis conniventium exeuntes. *Stigmata* magna, ramosa.

SEM. unicum, triquetrum, calycis foliolis conniventibus inclusum.

*Caulis* altus, striatus.

*Folia* alterna, petiolata, magna, ovata, integra.

*Flores* in spicis laxis, ramulorum terminatricibus, verticillatim siti.

OBS. *Primo sola stamina apparent, illis vero defloratis stigmata laciniata explicantur.*

83. RUMEX aquatica, calycis foliolis omnibus æqualibus & similibus radice exterius & interius flava.

84. Ru-

84. RUMEX aquatica, calycis foliolis omnibus similibus, radice exterius nigra, interius aurantii vel crocei coloris.

Britannica *Veterum*.

Inspicienti harum duarum plantarum partes, nulla differentia, nisi in sola radice, se obtulit.

In priori specie (82) Radix magis pallide flava, ejusdem coloris & externe & interne, ramosa, nullis annulis notata, & consistentiæ magis tenacis. Altera (83) crescit in luto profundo, aquoso, nigro: Radix exterius nigra, rimis circularibus notata, interius coloris aurantii vel crocei, fragilis, spongiosa, minime fibrosa, sed fibras tenuiores lateraliter emittens.

OBS. *Hæc planta est secretum magnum nostris Indigenis, ad ulcera phagædenica, ad quod Christianis revelandum, quocunque pretio, alluci non potuerint, sed felici casu detectum. Ego etiam vidi ulcus Palati phagædenicum, in quo os palati peresum erat, cum successu inopinato curatum, lavando solummodo ulcus decocto radice & haustulo ejus quotidie exhibito.*

## O C T A N D R I A

### MONOGYNIA.

85. ACER folio palmato-angulato, flore fere apetalo sessili, fructu pedunculato corymboso. *Gron. virg. 41.*

Ex eadem gemma flores plures, singuli pedunculati erumpunt.

CAL. *Perianthium* polyphyllum; folia lanceolata, colorata, rubra.

COR. nulla, saltem non distinguenda a calyce.

STAM. *Filamenta* quinque, subulata, aliquando sex.

*Antheræ* simplices.

P 2

PIST.

**PIST.** *Germen* compressum, triangulare, *Styli* (vel *Stigmata*) duo, reflexi, rubri.

**PER.** *Capsula* compressa, in alam longam membranaceam bifurcatam extensa.

**SEM.**

*Floret* primo vere, ante eruptionem foliorum ex unaquaque gemma, flores quinque primo sessiles, & ita conjuncti, ut videantur unicus flos ex folis antheris sessilibus constans. Pedunculati autem gradatim elongantur, & tum Calyces apparent, & Filamenta staminum eodem tempore elongantur. *Styli* non apparent nisi post occisum staminum.

**OB.** *Ex succo hujus arboris, ante eruptionem foliorum, primo vere saccharum conficiunt Indigenæ, & maxima succi quantitas ex arbore hoc tempore vulnerata effluit.*

86. **OENOTHERA** prior.

**CAL.** *Perianthium* monophyllum, coloratum, deciduum: *Tubus* cylindræus; *Limbus* quadripartitus, laciniis lanceolatis, reflexis.

**COR.** *Petala* quatuor, cordata, calyci infra divisuras inserta.

**STAM.** octo. *Antheræ* erectæ.

**PIST.** *Germen* infra calycem, pyriforme, quatuor striis notatum. *Stylus* unicus declinatus. *Stigma* quadrifidum: laciniis arcuatis.

**PER.** *Capsula* pyriformis, alis quatuor longitudinalibus quadrilocularis.

**SEM.** plurima, minima.

*Folia* alterna oblonga, ovata, acuminata integra, vix petiolata; quatuor foliola ad alas foliorum majorum

*Flores* singuli ex alis foliorum.

87. OENOTHERA foliis lineari-lanceolatis undulatis.

*Gron. virg. 42. Clayt. n. 200.*

CAL. *Perianthium* monophyllum, coloratum deciduum. *Tubus* longissimus cylindraceus; *Limbus* quadripartitus, laciniis longis, lanceolatis deflexis.

COR. *Petala* quatuor, cordata, calyci inserta.

STAM. *Filamenta* octo. *Antherae* erectae.

PIST. *Germen* infra calycem, pedunculi instar, cylindraceum, striatum. *Stylus* unicus, longissimus, longitudine calycis & corollae. *Stigma* quadrifidum; laciniis erectis parallelis.

PER. *Capsula* cylindrica, striata, quadrilocularis, apice dehiscens. In capsula arida striae evanescent.

SEM. plurima, quadrangularia.

*Caulis* simplex, foliosus, altus.

*Folia* oblonga, elliptica, alterna, vix petiolata.

*Flores* in spica caulis terminatrici.

88. EPILOBIUM noveboracense.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum (nisi sit error in manuscripto).

COR. *Petala* quatuor, cordata.

STAM. *Filamenta* octo: quatuor breviora.

PIST. *Germen* infra receptaculum floris, longum, gracile, quadrangulare. *Stylus* unicus. *Stigma* globulare.

PER. *Capsula* longa gracilis, quadrangularis, (nisi fallor unilocularis).

SEM.

*Caulis* ramosus, brachiatus.

*Folia* bina opposita, lanceolata, serrata.

*Flores* & fructus singuli ad extremitates ramulorum. *Flores* dilute rubentes.

*Crescit in madidis.*

## TRIGYNIA.

89. PERSICARIA foliis falcis, acris.  
 CAL. nullus.  
 COR. monopetala, quinquepartita.  
 STAM. octo.  
 PIST. *Germen* pyramidale, trigonum. *Styli* tres, vel  
 potius *Stylus* unicus trifidus.  
 PER.  
 SEM.  
*Caulis* nodosus, ad ortum foliorum.  
*Flores* sparsim in spicis longis linearibus, ex alis  
 foliorum.
90. PERSICARIA acris vulgaris, floribus in spicis cau-  
 lis terminatricibus sparsim fitis.  
*Stamina* quinque & septem, nunquam octo, & *Sty-  
 li* tantum duo.
91. PERSICARIA mitis vulgaris, foliis maculatis, flori-  
 bus in spicis ex foliorum alis, vel caulis termi-  
 natricibus, dense fitis.  
*Stamina* sex.
92. HELXINE foliis sagittatis caule aculeato. *Gron.  
 virg.* 84.  
*Nostratibus* Cowlongue.  
*Flores* in spicis ex foliorum alis, ita exigui, ut vix  
 Stylos numerare potuerim, & multo minus ne-  
 ctaria observare. Mihi videtur *Stylus* unicus, tri-  
 fidus, cum tribus distinctis Stigmatibus.  
*Caulis* longissimus, ramosus, gracilis, quadrangu-  
 laris; angulis aculeatis.  
*Folia* alterna, sagittata, petiolata. Nervus in dorso  
 folii etiam aculeatus & vestibis adhærens.  
*Crescit in madidis.*

93. HELIXINE scandens volubilis. *Gron. virg.* 157.  
 CAL. *Perianthium* foliolis quinque: quorum tria carinata, persistentia; duo colorata, non carinata & decidua.  
 COR. nulla, nisi duo foliola Calycis sint.  
 STAM.  
 PIST. - - - *Stylus* non accurate observare potui; *Stigmata* tria, globularia.  
 PER. *Calix* fit Capsula triquetra, tribus alis longitudinalibus auctus.  
 SEM unicum, triquetrum, nigrum.  
*Flores* exigui.  
*Folia* alterna, cordata, glabra, petiolata. *Radix* annua.

E N N E A N D R I A  
 MONOGYNIA.

94. LAURUS foliis integris trilobisque. *Gron. virg.* 46.  
*Sassafras*.  
 CAL. nullus, nisi fundum corollæ calycem diceres.  
 COR. *Petala* sex, ovato-acuminata.  
 STAM. *Filamenta* novem, compressa. *Antheræ* erectæ, compressæ, staminibus latiores, fere quadratæ. *Corpuscula* sex, globosa, mollia, petiolo brevissimo affixa, Germen circumstantia.  
 PIST. *Germen* globulare. *Stylus* unicus; in quibusdam floribus ejusdem arboris styli duo. *Stigma* obtusum.  
 PER. *Drupa* fere sicca, in calyce locata, sicut glans quercina, quæ cum areseat, fit  
 SEM. *Nux* globularis, parum compressa. *Nucleus* ejusdem figuræ.  
*Stamina* facile dejicit.  
*Flores* pedunculati, in racemis, ad extremitates ramorum. *Folia*

*Folia* furculorum unius anni elliptica, integra; ligni veterioris trilobata.

95. LAURUS foliis enervibus ovatis, utrinque acutis.

*Gron. virg. 46.*

*Nostratibus* Wild all Spice, vel Wild Pimento.

CAL. nullus, nisi corollam sic dicas.

COR. *Petala* sex, ovato-acuminata, concava, expansa.

STAM. *Filamenta* novem, compressa, sex exteriora, tria interiora. *Antheræ* didymæ, summitati filamentorum utrinque adnatæ.

*Nectaria corpuscula* sex, mollia, irregularia, singula pedunculo brevissimo prope basin intimi ordinis filamentorum affixa.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* nullus.

PER. nullum.

SEM.

OBS. *Numerus petalorum & staminum incertus; aliquando octo Petala & duodecim stamina.*

*Folia* obverse elliptica, utrinque acuminata, alterna, petiolata, integerrima, odorata, planis longitudine ramulorum parallelis.

*Folia* minora, fere circularia, interspersa.

*Flores* lutei, parvi, folia antevertunt, et crescunt in acervis, per longitudinem ramulorum dispersis, hoc est, plurimi pedunculo singulo simplici eisdem fundo affixi.

*Crescit ad ripas rivulorum. Floret aprili.*

## DE CANDRIA

### MONOGYNIA.

96. MITELLA scapo diphylo. *Linn. cliff. 167.*

CAL. *Perianthium* campanulatum, pentaphyllum, coloratum; foliis ovato-acuminatis.

COR.



COR. *Pentapetala*, petalis tenuiter laciniatis, & veluti ramosis.

STAM. *Filamenta* quinque. *Antheræ* globosæ.

PIST. *Germen* orbiculare, supra floris receptaculum. *Stylus* unicus.

PER. *Capsula* ovalis, unilocularis.

SEM. plurima.

*Caulis* simplex.

*Flores* in spica caulis, terminatrici, tenui, laxa.

*Folia* duo tantum opposita, sessilia ovato-acuminata, tricuspidata, caulina.

97. ANONYMA foliis ternis.

CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum; ore decem dentibus, alternatim longioribus reflexis; brevioribus latioribus erectis.

COR. *Petala* quinque, ovata, calyci inserta.

STAM. *Filamenta* decem, quorum longiora quinque, calycis ori inter petala inserta, breviora inferius inserta.

PIST. *Germen* orbiculare, supra receptaculum floris. *Stylus* unicus, curvatus.

PER. *Capsula* globularis, quinquelocularis, calyce tecta.

SEM. dura, globularia.

*Caulis* longus, gracilis, inclinatus, angulosus, sulcatus, rubens, ramosus.

*Folia* omnia erecta, terna verticillatim posita, petiolata, lanceolata, integra, glabra, in ramulis sæpe bina opposita.

*Flores* in verticillis ad alas foliorum.

*Æstate* solummodo crescit, & ad primum gelu marcescit, frigoris impatiens.

*In aquaticis crescit; Floret mense Augusto.*

Q

98. A.

## 98. ANONYMA pedunculis arcuatis.

Subfrutex.

CAL. *Perianthium* duplex, infra germen: *Exterius* parvum diphyllum, foliolis duobus circularibus persistentibus. *Interius* majus, coloratum, monophyllum, quinquepartitum: laciniis ovatis; post occasum floris crassescit, germen arcte amplectitur, fitque fructus tegumentum carnosum, coloratum.

COR. *Petalum* unicum, ovatum: ore quinquefido: laciniis parvis, obtusis, revolutis.

STAM. *Filamenta* decem, subulata, corolla dimidio breviora, lanugine recta, basi corollæ affixa. *Antheræ* magnæ, didymæ, bicornes, cornibus bifidis.

PIST. *Germen* orbiculare, ab inferiori parte circulo virescente cinctum. *Stylus* cylindræus, longitudine corollæ, post occasum floris, persistens. *Stigma* crassiusculum.

PER. *Bacca* rubra umbilicata, stylo remanente in centro umbilici. *Exterior* carnosâ pars *Baccæ* fit ex interiori perianthio crassescente, & capsulam globosam - - -, unilocularem.

SEM. plurima, ossea, angularia, placentæ adhærentia. *Est planta perennis, sempervivens, humillima.*

*Caulis simplex, lignosus.*

*Folia* alterna, rigida, ovata, integerrima; petiolis brevissimis.

*Flores* albi: singuli pedunculis longis arcuatis ex foliorum alis pendulis.

*Junio* floret, *Hyeme fructus maturefcit in solo sterili.*

## 99. PYROLA noveboracensis.

CAL. *Perianthium* quinquefidum: laciniis ovato-acuminatis.

COR

**COR.** *Petala* quinque, subrotunda, concava, patentia.

**STAM.** *Filamenta* decem, versus petalum superius, inclinata. *Antheræ* nutantes, magnæ, furtum bicornes.

**PIST.** *Germen* orbiculare fulcatum, quasi ex quinque globulis unitis compositum. *Stylus* unicus staminibus longior, versus petalum inferius declinatum & reflexum, forma proboscidis, ita ut mariti & uxor sese averfari videantur.

**PER.** *Capsula* subrotunda, pentagona, quinquelocularis, angulis dehiscens, stylo remanente.

**SEM.**

*Caulis* simplex, angulatus, nudus, nisi quod folia lanceolata colorata alba ad exortum pedunculi uniuscujusque floris.

*Folia* radicalia, circularia, parum utrinque acuminata, integerrima: petiolis compressis longis; sempervirentia.

*Flores* nutantes, pedunculati, in spica caulis terminatrici.

100. **ANDROMEDA**, *Nostratibus* Dwarf Laurel.

**CAL.** *Perianthium* minimum, quinquentatum.

**COR.** *Monopetala*, perianthio, antequam expanditur, non tecta, sed sacculi ligati instar limbus collectus: postquam expanditur, campanulata, patula, foveis decem impressione antherarum effectis notata. *Limbus* quinquefidus: incisuris brevibus: laciniis reflexis.

**STAM.** *Filamenta* decem a centro declinata. *Antheræ* globosæ.

**PIST.** *Germen* globulare. *Stylus* unicus, staminibus longior, persistens. *Stigma* obtutum.

**PER.** *Capsula* dura in quinque segmenta per axim dehiscens.

Q

SEM.

SEM. unicum in unoquoque segmento, minimum.  
*Subfrutex* sempervirens.  
*Folia* lanceolata, bina opposita.  
*Flores* rubri in verticillis densis.  
*Crescit in solo humido sterili, ovibus exitiosa.*

101. ANDROMEDA foliis ovatis obtusis, corollis corymbosis. *Gron. virg.* 160.

*Frutex* sempervirens.

Huic & priori: *Globulus Butyri satis magnus per gulam intrusus ovibus presentaneum est remedium, si satis tempestive exhibeatur, ut expertus sum.*

102. VACCINIUM, *Nostratibus* Wortle Berry.

CAL. *Perianthium* campanulatum. *Limbus* quinquefidus; laciniis semicircularibus, persistens, germiini insidens.

COR. monopetala, tubulata, ore arctiore, quinquefido: laciniis reflexis.

STAM. *Filamenta* decem, corolla breviora, stylum arcte circumstantia. *Antheræ* erectæ, bifidæ.

PIST. *Germen* orbiculare infra receptaculum. *Stylus* unicus, staminibus longior. *Stigma* obrusum.

PER. *Bacca* globosa, umbilicata, quinquelocularis.

SEM. decem, radiatim ad centrum posita, duo in unaquaque cellula.

*Vaccinium* baccis nigris minoribus, foliis alternis integris ovatis, floribus albis.

103. VACCINIUM baccis saturate cæruleis majoribus succulentioribus.

Omnia præterea ut in priori.

*Florent* Aprili & Majo.

*Omnes sunt Decandræ & inspexi plures.*

104. ARBUTUS *Nostratibus* Bearberry.

CAL. *Perianthium* campanulatum, limbo quinque-  
dentatum, infra germen.

COR. *Monopetala*, campanulata, patens, quinquefida.

STAM. *Filamenta* decem, crassa, brevia, arcte sty-  
lum ambientia: *Anthere* erectæ, filamentis qua-  
tuor terminatæ; quorum duo longiora, erecta,  
duo breviora ad angulos rectos exeuntia.

PIST. *Germen* orbiculare. *Stylus* unicus, staminibus  
longior. *Stigma* simplex.

PER. *Bacca* major, coloris herbacei, non edulis.

*Caulis* ramosus.

*Folia* alterna, ovata, acuminata.

*Tota* planta *Vaccinio* similima.

*Majo* floret.

QV. *An hæc sit Uva ursi, cujus vires lithontripticas*  
*describit LINNÆUS in præfatione ad orationem*  
*suam de Telluris habitabilis incremento?*

DIGYNIA.

105. SAXIFRAGA noveboracensis.

*Caulis* ramosus, aphyllus, nisi quod unicum folio-  
lum sit ad exortum uniuscujusque ramuli.

*Folia* radicalia, in terram procumbentia, ovata,  
crenata, petiolata, foliacea.

*Flores* ad extremitates ramulorum in corymbo.

*Floret* Aprili.

TRIGYNIA.

106. DRYPIS foliis quaternis.

*Silene* foliis quaternis. *Gron. virg.* 50.

CAL. *Perianthium* monophyllum, campanulatum,  
ore quinque-dentatum, persistens.

COR. *Petala* quinque: *ungues* longitudine calycis  
angusti. *Bractea* lata, laciniata seu fimbriata.

Q 3

STAM.

STAM. *Filamenta* decem, quorum quinque unguibus petalorum inserta. *Antheræ* incumbentes.

PIST. *Germen* globosum. *Styli* tres, filiformes. *Stigmata* simplicia.

PER. *Capsula* globularis, calyce tecta.

SEM. Reniformia.

*Caulis* simplex.

*Folia* quaterna, verticillatim posita, lanceolata, integra.

*Flores* albi in spica caulis terminatrici: quorum sex bini oppositi: septimus spicam terminat.

107. ALSINE foliis lanuginosis.

CAL. *Perianthium* pentaphyllum, foliolis lanceolatis, persistentibus.

COR. *Petala* quinque, fere semibifida.

STAM. *Filamenta* decem, capillaria. *Antheræ* globosæ.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* nullus. *Stigma* patulum.

PER. *Capsula* unilocularis, conica.

SEM. plurima, globularia.

*Folia* lanuginosa, lanceolata, sessilia, bina opposita.

108. ALSINE foliis pilosis, floribus pentagynis.

Omnia ut in præcedente, excepto, quod *Stylos* habeat quinque.

### PENTAGYNIA.

109. OXALIS foliis ternatis cordatis, flore luteo.

## D O D E C A N D R I A

### MONOGYNIA.

110. ASARUM foliis subcordatis petiolatis. *Gron. virg.* 52.

*Nostratibus* (errore) Coltsfoot.

*Folia* duo radicalia, petiolata.

*Flos* unicus, pedunculo brevi ex ala foliorum.

DIGY.

DIGYNIA.

III. AGRIMONIA inodora, foliis omnibus pinnatis, fructu hispido. *Linn. cliff. 53.*

*Agrimonoides. Tournef.*

*Calyx* floris simplex, dum petala subsistunt, post autem petalorum occasum *Calyx novus* protruditur infra priorem, ex plurimis foliolis setaceis constans.

*Calyx* primus clausus tegit embryonem.

*Stamina* septem.

*Folia* pinnata, impari maximo costam terminante: minimis alternatim interpositis. Duo folia minorum semicircularia sessilia, opposita ad exortum foliorum ex caule.

*Flores* in spicis laxis ad extremitatem caulis.

*Stamina & Styli* vix nudis oculis distinguenda.

I C O S A N D R I A

MONOGYNIA.

II2. PRUNUS sylvestris.

In omnibus floris partibus cum Pruno hortensi convenit.

*Fructus* membrana tenaci tegitur, succulentior mollior. *Nucleus* ovatus compressus.

*Caulis* humilior.

II3. CERASUS sylvestris.

In omnibus fructificationis partibus, cum Ceraso hortensi convenit, nisi quod *flores & fructus* in racemis longis.

II. FRUTEX noveboracensis.

*CAL. Perianthium* monophyllum, campanulatum.

*Limbus* quinquefidus: laciniis lanceolatis, totaliter reflexis.

*COR.*

COR. *Petala* quinque, longa, obtusa, calyci inserta.  
 STAM. *Filamenta* circiter viginti, calyci & corollæ inserta.

PIST. *Germen* infra receptaculum globulare. *Stylus* unicus, femiquinquefidus.

PER. *Bacca* globularis, calyce coronata, quinquelocularis.

SEM. Duo reniformia, in unoquoque loculo, sed sæpe unum, aliquando ambo marcescunt ante maturitatem.

*Folia* alterna, ovata, tenuiter serrata, petiolata, fibra unica longitudinali ramulos laterales oppositos emittente.

*Flores* in racemis.

*Floret primo vere, antequam folia erumpant; floribus tum totus vestitus ubique fere in sylvis aspicientium oculos ad se allicit. quare imperitiæ meæ attribuo, quod ad certum Genus referre nequeo; nam quod a Botanicis plurimis observata sit, haud dubito.*

115. CRATÆGUS foliis ovatis repando-angulatis serratis. Gron. virg.

CAL. *Perianthium* monophyllum, quinquefidum, concavo-patens: laciniis lanceolatis, interius in fundo coloratum.

COR. *Petala* quinque, subrotunda, calyci inserta.

STAM. *Filamenta* decem (licet sæpius unum vel alterum deficiat,) longitudinis corollæ, calyci inserta.

PIST. *Germen* infra calycem. *Stylus* unicus, trifidus.

PER. *Bacca* carnosa, sphaeroidea, umbilicata.

SEM. quatuor, oblonga, angulata, durissima.

*Flores* in racemis.

*Folia* triangularia, alterna.

*Ramuli* spinis longis armati.

PEN.



PENTAGYNIA.

116. SPIRÆA noveboracensis.

CAL. *Perianthium* quinquefidum : laciniis acuminatis, persistens.

COR. *Petala* quinque, subrotunda, calyci inserta.

STAM. *Filamenta* plurima, capillaria, *Antheræ* erectæ.

PIST. - - - - - *Styli* quinque.

*Circulus* quidam rubens inter stamina & Pistillum.

PER. *Capsula* quinque, parvæ, acuminatæ.

*Folia* alterna, petiolata, ovata, serrata.

*Flores* in spicis crassioribus.

*Est subfrutex, florens per totam æstatem, sed partes floris ita exiguæ, ut non facile distinguantur nudis oculis.*

117. FILIPENDULA foliis ternatis. *Linn. cliff.* 191. *Gron.*

*virg.* 55.

*Ipecacuanha. D. Clayton.*

CAL. *Perianthium* campanulatum monophyllum, quinquedentatum, persistens.

COR. *Petala* quinque, longissima, lanceolata, calyci inserta.

STAM. *Filamenta* circiter quindecim, brevia, calyci inserta. *Antheræ* orbiculares.

PIST. *Germen* globulare. *Styli* quinque. *Stigmata* simplicia.

PER. *Capsula* vel *Semina* quinque instar segmentorum circuli per axin divisi.

*Folia* ternata, alternata, oblonga, elliptica, rugosa, serrata.

*Caulis* ramosus, glaber, atro-rubens.

*Flores* ad extremitates ramulorum paniculati.

*Radix* perennis, fibrosa: fibra lignea cortice crasso carnosio tecta.

R

Obs.

OBS. *Radix amara, non autem nauseosi gustus. qualis Ipecacuanne verae, & coloris magis rubentis. Duplam requirit Dosis Ipecacuanne, & non ita certo operatur; certius vomitum movet decocta ad Drachmas duas.*

### POLYGYNIA.

118. *ROSA* sylvestris inodora cynosbatos. *Clayt. Gron. virg. 55.*
119. *RUBUS* caule erecto, foliis quinatis, more pinnatarum, uno costam terminante, quatuor reliquis oppositis, spinis tenuioribus, floribus albis, fructu conico rubro.  
*Nostratibus* Raspberry.
120. *RUBUS* caule erecto, foliis quinatis, petiolis foliorum ex uno nodo tanquam centro ortis; spinis rigidioribus, floribus albis, fructu cylindrico nigro. (*videtur* *Rubus* caule aculeato, foliis ternatis & quinatis. *Hort. cliff. 192.*)
121. *RUBUS* caule erecto, foliis simplicibus quinquelobatis angulatis, flore rubro, fructu rubro compresso. (*Est* *Rubus* caule inermi multifolio multifloro, foliis palmatis. *Hort. cliff. 192.* *Rubus odoratus. Corn. canad. 149. t. 150.*)
122. *RUBUS* caule repente; foliis ternatis, fructu nigro compresso.
123. *POTENTILLA* noveboracensis.  
CAL. *Perianthium* foliis decem lanceolatis, quorum quinque exteriora longiora: totidem interiora.  
COR. *Petala* quinque, obtusa, calyci inserta.  
STAM. *Filamenta* plurima, calyci inserta, circiter quindecim.

PIST. - - - - *Styli plurimi super capitulum globosum.*

PER. nullum, sed quinque interiora calycis foliola conniventia placentam conicam tegunt.

SEM. *Plurima*, minima, facillime a placentis separabilia.

*Folia ternata serrata.*

*Flores lutei.*

124. GEUM foliis ternatis laciniatis.

*Foliis ternatis laciniatis, medio majori, flore albo, fructu globofo. Stylis persistentibus elongatis.*

## P O L Y A N D R I A M O N O G Y N I A.

125. ACTÆA racemis longissimis. *Gron. virg. 57.*

*Nostratibus Rich weed, & aliquibus Black-snakeroot.*

CAL. *Perianthium* foliis quatuor, circularibus, concavis, coloratis, albis, ad primam explicationem floris decidua.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* plurima. *Antheræ* ovatæ, compressæ.

PIST. *Germen* ovatum. *Stylus* unicus, brevis. *Stigma* simplex.

PER. *Capsula* (minime bacca) ovata oblonga, unilocularis, bivalvis, dehiscens.

SEM. *Plurima*, semiorbicularia, captulam duplici ordine replentia, ita ut sint segmenta sphaeroidis dupliciter sectæ, semel per axin & pluries transversim.

*Caulis* simplex, sexpedalis.

*Folia* radicalia, petiolata, pinnata; more plurium umbellatarum; *Petioli* maximi trichotomi.

R 2

*Flores*

*Flores pedunculati in spicis longissimis caulibus terminatricibus.*

**OBS.** *Dixit mihi Practicus Medicus se sæpius uti radicibus ad dissolvendos tumores scirrhusos forma cataplasmatibus applicatis.*

*Quidam vicinus tincturam radicis hujus (pro radice Araliæ foliis cordatis errore assumptæ) exhibuit famulo suo querenti de languore & lassitudine spontanea; induxit ægritudinem maximam cum sudoribus frigidis, & valetudinem pristinam statim recuperavit.*

*Christophoriana baccifera est omnino diversi generis planta, & ab hac distincta; cujus descriptionem antea dedi sub Leontice - - - cuius caulis est simillimus foliis radicalibus Actææ; Baccæ ejus globosæ in racemis.*

126. SANGUINARIA. *Linn. cliff. 202. Gron. virg. 57.*

*Nostratibus Blood-root.*

*Calycem nullum observavi.*

*Antheræ erectæ, longæ, luteæ. Cetera ut a LINNÆO descriptæ.*

*Scapus nudus, sustinens unicum florem.*

*Folium unicum, radicale, subrotundum, petiolatum, lobatum: sinibus profundis angustis.*

*Radix carnosa, fragilis, succo rubescente abundans.*

*Crescit in humidis: primo vere floret.*

**OBS.** *Ad Ictericum efficax remedium.*

127. EUPHORBIA noveboracensis.

**CAL.** *Perianthium monophyllum, infundibuliforme.*

**COR.** *Petala quatuor, ovalia, calycis limbo inserta, persistentia.*

*Nectarium, corpus quoddam orbiculare ad unguem petalorum.*

**STAM.**

- STAM. *Filamenta* quatuor, apicibus furcata. *Anthera* octo, unicuique filamento duæ globulares.
- PIST. *Germen* ovatum, triquetrum, pedunculo insistent. *Styli* tres persistentes, furcati; laciniis reflexis.
- PER. *Capfula* subrotunda, triloba, trilocularis, stylis coronata, pedunculo germinis elongato, & inter duo petala reflexo, extra corollam dependens.
- SEM. subrotundum, in singulo loculo unum.
- Caulis* succulentus, procumbens, teres, ramulis ex alis foliorum.
- Folia* bina opposita, ovalia, acute ferrata: planis foliorum longitudini caulis fere parallelis, petiolata: petiolis brevissimis.
- Flores*, minimi ad extremitates ramulorum, pedunculis ex alis foliorum.
- Julio* floret in locis cultis.

128. PORTULACA foliis cuneiformibus glabris succulentis binis oppositis, ad summitatem caulis verticillatis. (Portulaca foliis cuneiformibus verticillatis sessilibus. *Linn. cliff.* 207. *Gron. virg.* 59.)

PENTAGYNIA.

129. AQUILEGIA corolla simplici, nectariis fere rectis. *Linn. cliff.* 215. *Gron. virg.* 59.

POLYGYNIA.

130. LIRIODENDRUM. *Linn. cliff.* 223. *Gron. virg.* 60. *Nostratibus* White-wood, vel Canoe-wood-tree.
131. HEPATICA (foliis trilobatis, floribus cæruleis.) *Linn. cliff.* 223. *Gron. virg.* 61.
132. ANEMONE prima.

*Folia* caulina simplicia, tricuspidata, versus petiolum

lum cordata, ab extremitate caulis petiolis longis dependentia. Folia radicalia terna ternata, petiolo longo infidentia.

*Flores* in eodem caule plures.

133. ANEMONE secunda.

*Folia* caulina subfloralia terna ternata, ad petiolum acuminata: radicalia quinata.

*Flos* unicus in eodem caule.

134. ANEMONE tertia.

CAL. *Perianthium* foliolis quinque, ovatis, concavis, deciduis.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* plurima inter calycem & seminum placentam inserta. *Antherae* erectae, didymae.

PIST. *Styli* plurimi in capitulo sphaerico.

PER. nullum.

SEM. Plurima, capitulo cylindrico adhærentia, at tomento implicata.

*Caulis* surgit nudus ad altitudinem circiter pedalem, qua altitudine dividitur in duos vel plures ramulos parallelos, qui iterum sæpius subdividuntur in duos parallelos.

*Folia caulina* tria ternata, acuminata, laciniata, ex nodo ad exortum ramulorum.

*Folia radicalia* ternata, petiolis longis insistent.

135. CLEMATIS scandens.

CAL. nullus.

COR. *Petala* quatuor, oblongo-ovata, expansa.

STAM. *Filamenta* plurima, compressa.

PIST. *Germina* plurima in globum congesta, desinentia in *Stylos* subulatos simul conum efformantibus.

PER. nullum.

SEM.

SEM. Plurima, ovata, compressa, stylo longo incurvato, qui ut arefcit, fit pappus villosus.

*Caulis* rubens, angulosus, longissimus, gracilis, late super arbores & frutices scandens, petiolis foliorum circa ramulos arborum contortis se sustinens.

*Folia* ternata, ovata, acuminata, dentata, bina opposita, petiolis longis insistentia.

*Flores* albi, in racemis umbellatis, pedunculo communi longo insidentes.

OBS. *Aliquas hujus speciei plantas solos flores Masculos producentes observavi.*

136. THALICTRUM præcox.

CAL. *Perianthium* foliolis quatuor, ovatis, persistentibus.

COR. nulla.

STAM. *Filamenta* plurima, capillaria, purpurea. *Anthera* longæ, filamentis multo crassiores, luteæ.

PIST. *Styli* plurimi, vix perceptibiles.

PER. nullum.

SEM. Plura ovata, striata.

*Folia* trilobata, versus petiolos lata, petiolis longis ab extremitatibus ramulorum dependentia.

*Flores* in umbella nutantes.

137. THALICTRUM alterum.

*Calyx* decidit, quamprimum flos expanditur.

*Flores* erecti, solis staminibus consistere videntur, albi.

*Semina* ut in priori.

*Folia* ternata, petiolata.

*In madidis crescit.*

138. RANUNCULUS primus.

*Corolla Petala* calyce longiora obtusa.

*Capi-*

*Capitula Seminum* hemisphærica.  
*Semina* compressa, acuminata.  
*Folia* terna ternata.

139. RANUNCULUS secundus.

*Corolle Petala* parva, lanceolata, calyce non longiora.

*Capitula Seminum* cylindræca.

*Semina* globularia,

*Caulis* erectus.

140. RANUNCULUS tertius.

*Solis Petalis* parvis, ovatis, obtusis a secunda specie differt, & quod sit serotinus.

*Nectarium* in hisce tribus speciebus, squama vel folliculus minimus ad unguis petalorum.

141. CALTHA (palustris, foliis cordatis.) *Linn. lapp.*  
 227. *Gron. virg.* 166.

• *Quæ sequuntur Plantæ, anno proximo prodibunt.*





# S I D A

*Florum capitulis pedunculatis tri-  
phyllis septemfloris descripta*

<sup>A</sup>  
CAROLO LINNÆO.

---

**P**lantam promo minus cognitam ex Horto Aca-  
demico Upsaliensi, quæ primo vere fata eo-  
dem anno excrevit in altitudinem duorum  
pedum.

Patriam agnoscit AMERICAM, ejusque regiones cali-  
diffimas: *Jamaicam, Galliam æquinoctialem* & adja-  
centes provincias, insulasque *Caribæas*, ubi in aquis  
stagnantibus, locisque palustribus frequens est.

Primam hujus notitiam debemus illustr. SLOANEO  
1696, qui eandem dixit *MALVAM asperam majorem  
aquaticam ex hortensium seu rosarum genere, flore  
minore luteo, semine aculeato. Sloan. Cat. Jam. 96.  
hist. I. p. 217. t. 137. f. 1.* quæ omnia, excepta figura,  
in suum opus transtulit *Rajus in supplem. 320.*

Secundam ejus mentionem fecit PLUMIERUS 1703. in  
novis plantarum Americanarum Generibus & Spe-  
ciebus, ubi dicta fuit *MALVA frutescens hirsuta, flo-  
ribus luteis in capitulum congestis. Plum. Spec. 2.* sed  
præter solum nomen nihil habet laudatus auctor.

Tertia ejus mentio facta est a Celeb. ROYENO 1740, a  
quo dicta fuit *MALVA caule recto hispido, foliis lo-  
batis crenatis difformibus. in Fl. Leid. prod. 357.* A plu-  
ribus auctoribus ejus mentionem factam fuisse non  
recordor.

S

HISTO-

HISTORIAM plantæ nullus dedit, excepto solo Sloaneo, quam latina veste indutam proposuit Rajus l. c. hisce verbis. PLANTA ad quadrupedalem altitudinem exsurgit, CAULE singulari, recto, firmo, tereti, virente, asperis & propemodum spinosis pilis obfuso, FOLIIS & Ramulis ad fescuncialia intervalla nullo ordine egredientibus. FOLIA Malvæ hortensis, seu Lappæ minoris similia, bilare viridia, 4. uncias longa,  $3\frac{1}{2}$  lata, angulosa, in 3, 4ve apices divisa, sinuata & dentata, circa margines pediculis uncialibus insistentia. Ex alis foliorum in eodem, seu communi, brevi, hirsuto, quadrantem uncie longo, piloso PEDICULO plures egrediuntur flores, quorum unicuique subest foliolum viride auriculatum asperum. FLOS autem e 5 floris amplis petalis componitur, medium occupantibus totidem aut pluribus STAMINIBUS luteis. Floribus fatiscentibus restant 5 vel 7 SEMINA triangularia, leucophaea, inferiori parte acuminata, superiori subrotunda, malvaceorum in modum sita, calice exiguo inclusa & foliolo auriculato suprascripto cooperta.

Descriptionem ad vivam plantam factam, eamque perfectiorem heic sistere lubet.

CAULIS fruticosus, bipedalis, teres, crassitie pennæ olorinæ, viridis, subpilosus, erectus.

FOLIA alterna, petiolata, palmum lata, cordata, utrinque viridia, subpilosa utrinque: magis autem subtus, venosa: venis utrinque convexis, patentia, obtuse ferrata: ferraturis ruffis, obtusa; inferiora folia majora, quinqueloba, rotundiora; superiora vero magis oblonga, triloba lobis lateralibus minoribus. Petioli foliorum folio dimidio breviores, pilosi, teretiuseculi, supra sulco exarati, patentes, apice ascendentes.

RAMI

**RAMI** ex alis foliorum erecti, solitarii, simplices, inferiores spithamales, superiores breviores.

**PEDUNCULI** solitarii ex ala foliorum, inter pedunculum scilicet & Ramum, petiolo breviores, erecti, nudi, simplicissimi, magis pilosi pilis albidis, apice ferentes fructificationis capitulum involuero cinctum.

**STIPULÆ** ad axillas utrinque 2, subulatae, pollicem transversum longae, minus pilosae, deciduae, quarum exterior altior pedunculo propius adhaerens.

**INVOLUCRUM** triphyllum, capitulum florum aut fructuum colligens: Foliolis cordatis, sessilibus, nervosis, venoso-reticulatis, erectis, longitudinaliter complicatis, lateribus reflexis, pilosis, acutis, apice saepe tridentatis; horum interius foliolum dimidio minus.

**FLORES** septem, sessiles, involuero breviores, quarum unicus intra singulum folium involucri; deinde intra singulos hos flores singuli adsunt flores & in centro horum omnium unicus. *Setae* binae tribus floribus adsunt, ab utroque latere scilicet singulae, reliquis vero floribus tribus tantum unica, at centrali flori nulla. Sunt haec setae filiformes, floribus paullo longiores, erecti, virides.

**CALYX** (singuli floris) *Perianthium* monophyllum, ovatum, quinquangulare, quinqueplicatum, quinque-dentatum, sulcatum, connivens.

**COROLLA.** *Petalis* 5, obtusis, erectis, calyce paullo longioribus, flavis, integerrimis.

**STAMINA.** *Filamenta* plurima, inferne coalita, petala connectentia, Corollam breviora. *Antherae* subrotundae, flavae.

S 2

PISTIL-

**PISTILLUM.** *Germen* subrotundum, quinquesulcatum. *Stylus* cylindræus, staminibus paullo longior, femidecemfidus. *Stigmata* obtusa, reflexa.

**PERICARPIUM** turbinatum depresso vertice, quinquecapsulare, capsulis ovatis, deorsum acuminatis, introrsum angulatis, muticis.

**SEMINA** solitaria, reniformi-ovata, deorsum acutiuscula.


**FIGURAM** adjecimus, cum capitula hæc florum in Sloanea fessilia delineantur nec pedunculata, nec involucria in conspectum prodeunt, ut cætera taceam.

- a. *Flos* naturali magnitudine.
- b. *Capitulum* involucrio cinctum, naturali magnitudine.
- c. *Capitulum* explicatum, triphyllum, raro tetraphyllum.

**GENUS** difficile determinatur; involucrium universale triphyllum, calycem communem triphyllum mentiens, videtur indicare Genus Malvæ, ut faciem taceam, eamque ob rationem Cel. Royenus Malvis accensuit; at enim vero, quum perianthium proprium sit duplex & exterius triphyllum in Malvis, non ita facile esset hanc sub Malvis quærere. Dein corolla, pistillum, femina Sidis exacte conveniunt; hinc diximus plantam *SIDAM capitulis pedunculatis triphyllis septemfloris.*





Figura 1




Tab. I.

Figura 2







p. 137.

Act. Upsal. 1743.

C.G. Reimers del.

C. Bergius sculpsit et excudit

S.G.A. *Storax capitis pedunculatis triphyllis septemfloris.*



Tab. II.





